



ЗАЛА 6.

ШКАФЪ 2881.

ПОЛКА 4. № 5

2






UT
84 M

~~N~~ $\sqrt{\frac{32}{24}}$ MR

1-6 3 Ks.

20 B.



ИСКУССТВА ПОВИВАНІЯ

или

науки о бабичьемъ дѣлѣ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

въ коей содержится

Краткое описаніе болѣзней, роженицамъ по
разрѣшеніи отъ бремени дѣпорожденія при-
ключающихся; примѣчанія о шакowychъ немо-
чахъ, достовѣрными опытами подшверждае-
мая; и средства къ опзраженію болѣзненныхъ
припадковъ способствующія.

Для пользы Россійскихъ лѣкарей и повивальныхъ
бабокъ.

сочинена трудами

Нестора Максимовича - Амбодика.

Врачебной науки Доктора и Профессора повиваль-
наго искусства.

Во градѣ С. Петра. 1786 года.



* * *

Роженицы могутъ бытъ подвержены почти всѣмъ
тѣмъ болѣзнямъ, коими страждутъ и другія жены.
Но еще сверхъ того, немочи состоянію ихъ свойст-
венныя, зависятъ наипаче отъ пяти причинъ: т. е.
отъ предшедшей беремености; отъ прошедшихъ ро-
довъ; отъ кровоочищенія послѣ родовъ бывающаго;
отъ задержанія млека: и отъ мѣсячнаго крошеченія.
Въ деревняхъ больше женъ умираетъ во время родовъ,
чѣмъ въ городѣ, отъ недостатка добрыхъ, и отъ
множества худыхъ вспоможеній. Въ городахъ больше
родильницъ мретъ по окончаніи родовъ, отъ слѣд-
ствій худого и испорченнаго здоровья. Нестолько ро-
ды, сколько слѣдствія родовъ бывають для роже-
ницъ бѣдственными и опасными, по причинѣ незнанія
и нерадѣнія о собшвенномъ своемъ благоповеденіи.

* * *

*



ПРЕДЪИЗВѢЩЕНІЕ

КО ПРЕДОХРАНЕНІЮ ЗДРАВІЯ И БЛАГО- ПОВЕДЕНІЮ РОДИЛЬНИЦЪ ОТНОСЯЩЕЕСЯ.

Найчувствительнѣйшее, и едва словомъ изображаемое, родильницею внутренно ощущаемое удовольствіе мгновенно рождается тотчасъ по благополучномъ ея родовъ окончаніи. Предшедшая жестокая родовая боль тогда ею предается совершенному забвенію. Родильница, видя исполненіе и удовлетвореніе своихъ желаній, во своемъ сердцѣ ощущаетъ найчистѣйшую радость и веселіе объемлющее и наполняющее всѣ ея мысли, чувства и движенія. Во пріятнѣйшемъ восторгѣ, и власно какъ въ изступленіи внѣ себя будучи, извѣляетъ оное живѣйшимъ восклицаніемъ. Она видя, осязая и обнимая свое новорожденное исчадіе, видитъ, такъ сказать, себя, самую переродившуюся, или возобновляемую въ собственномъ своемъ одушевленномъ опродіи, которое она чрезъ столько времени прежде носила во своей утробѣ. Она видя его уже су-

существующаго, отъ части кажется будто мысленно гордится тѣмъ, что ею произведено на свѣтъ новое существо, самой ей совершенно подобное, имѣющее во свое время быть полезнымъ, какъ ей самой, такъ и всему обществу сочленомъ. Такое родильницѣ о порожденіи своемъ умножаніе не есть мнимое или мечпательное только воображеніе: но торжественное признаніе, самымъ дѣломъ и бытіемъ существующее. Въ разныхъ человѣческихъ сообществахъ воздаются родильницамъ по разрѣшеніи ихъ отъ бремени опитныя почести и преимущества, коихъ онѣ передъ тѣмъ не имѣли. Мы не входя въ подробности сего изслѣдованія, прилѣжнѣе рассмотримъ, сколько трудовъ и болѣзней все оное стоитъ родильницамъ! сколь дорого беременіе, родовыя муки, и дѣтпорожденіе ими покупаются! сколь много требуется къ тому, чтобъ слыть матерью, и быть вновь произведенну на свѣтъ мысленному созданію! Невѣроятная судьба, сама природа, Божеское провидѣніе, священнымъ писаніемъ намъ открываемое, тако сему быть предъустановило, повелѣвъ единожды, женамъ раждати въ болѣзни и мученіи. Слѣдствіе грѣха и преступленіе завѣщанія, самымъ Богомъ, первымъ прародителямъ объявленнаго, навлекло

снѣ

сію казнь на все ихъ потомство. Сіе мы въ самой вещи съ соболюзованіемъ ежедневно видимъ; видимъ и явственно оудуцаемъ, что всевысочайшее существо снисходя терпѣнію и спрдаінію, къ тому предъопредѣленныхъ женъ, со-благОВОЛИЛО нѣкоторымъ образомъ умалишь жестокость родовой муки, перемѣняя природу, и подая надежныя средства къ облеченію и сп-вращенію родовой боли, способствующія; кои суть различны, смотря по различію поясовъ земныхъ, въ коихъ люди обитающъ.

Извѣстно, что Американки раждаютъ дѣтей почти нечувствительно, и едва испуская жалостной голосъ, родовую боль изъвѣляющій, равно какъ и жены, въ теплыхъ странахъ обитающія, часто рождъ дѣтей безъ всякаго труда и болѣзни. Извѣстно, что ничто столько рождъ неблагопріятствуетъ, какъ благоумѣренная теплоша воздуха, кою волокна мягкихъ плѣсныхъ частей смягчаются, раздаются и распространяются. Извѣстно, что сіе самое чувствительно умаляя ихъ упругость, уменьшаетъ и самую родовую боль, и тако дѣлаетъ роды сносными и непрудными. Извѣстно, что не только теплый воздухъ естественный, но и искусственная теплоша, какъ парная или влажная, такъ и сухая, онымъ содѣйствующъ,

приводя въ благоумѣренность упругую жизненную влагу, расслабляя чувствѣнныя жилы, смягчая и распуская упругость волоконъ. Извѣстно и то чиню въ холодныхъ странахъ, поелику чувствѣнныя жилы и мягкія тѣлесныя части оныя спужи сильно раздражаются, и болѣе упругими дѣлаются: оныя чего и роды часто бывающыя прудными, а потому и надлежитъ се о изряднѣ искусствомъ; слѣдственно, поелику теплоша воздуха естественная, и искусствомъ произведенная, весьма много разширенію мягкихъ частей и скорѣйшему родову окончанію поспѣшествуютъ: то въ разсужденіи сего парныя бани, теплыя пары, сонное зелье, и пріуготовленные изъ онаго лѣкарственное сосиавы, сему намѣренію наиболѣе способствуютъ.

Роды сравнить можно съ морскимъ приливомъ. Волны съ великою скоростію погоняющыя одна другую, и текущыя съ такою быспрохою и спремленіемъ, чиню смотрящему кажутся, будто все берега Океана ими наводняются: но вскорѣ возвращаясь обратно, едва по себѣ оставляющыя и слѣды бывшаго спремительныхъ водъ печенія. Родовая боль, или переймы спынашъ также, какъ волны, одинъ за другимъ, и силою своего дѣйствія часто приводятъ родящихъ и зрящихъ въ опечаленіе: но съ окончаніемъ родовъ и они не чувствовали.

спивительно проходящъ и болѣе не возвращающа, не оставляя и малѣйшихъ слѣдовъ бывшей своей жестокости. Тако бываетъ съ родами натуральными. Но противное сему случается въ родахъ трудныхъ, сверхъ естественныхъ, или испорченныхъ, гдѣ искусво иногда можетъ подавати нѣкоторую помощь, и пособляти изнемогающей природѣ: но иногда перемѣниши ея, и отвратиши случающіяся трудности ея и въ силахъ.

Опыты намъ доказываютъ, что роды, по наружности являющіеся быши и благополучнѣйшими, часто имѣютъ со всѣмъ противное окончаніе, и не соотвѣтствуютъ своему началу. Сіе не рѣдко зависитъ, какъ отъ повивальныхъ бабокъ, и прислужницъ, такъ и отъ самыхъ родильницъ. Отъ первыхъ, когда онѣ при родахъ присутствуя, во всемъ поспушаютъ превратнымъ образомъ. Отъ послѣднихъ, когда онѣ добродушной бабки совѣту и наставленію не слѣдуютъ.

Большая часть мнимыхъ бабокъ могутъ быти раздѣлены на три рода: либо онѣ суть совершенныя невѣжи, суевѣрны и сумазбродны: либо трусихи и боязливы: либо упрямыя, излишно на себя полагающіяся, и ни чьихъ добрыхъ совѣтовъ не пріемлющія. Жалки всѣ иѣ

родильницы, кои по несчастію въ руки таковыхъ бабокъ попадутся! все таковыя бабки не прежде ищутъ у знающихъ людей помощи въ случаѣ нужды, какъ только когда дѣло уже дошло до самой крайности: когда роды крайне запущены: когда пособить нѣтъ болѣе возможности: и когда искусство къ опроверженію встрѣчающихся родовыхъ препятствій недовлѣетъ. Часто отъ неразумія бабки, ложно мечтающей о себѣ, что она исправляетъ бабичье дѣло правильно и порядочно, роды естественныя не трудныя превращаются въ тяжелыя и сверхъ естественныя. Часто мнимыя бабки, бывши къ родящимъ приглашены, обходясь съ ними не оспорожно и нерадиво, находятъ для себя тайное нѣкое удовольствіе въ томъ, когда онѣ дѣлаютъ что нѣсть вопреки врачамъ, лучше ихъ знающимъ, какъ должно пещися о сохраненіи здравія женскаго пола. Часто таковыя бабки, по своему упрямству и закоснѣлому мнѣнію, все при родахъ располагаютъ, учреждаютъ, повелѣваютъ, ни о чемъ болѣе не помышляя и не радя, какъ только о исполненіи своихъ, единожды предпринятыхъ пагубныхъ намѣреній и закоснѣлыхъ предразсужденій. Часто сіи бабки въ то время, когда врачъ нарочито родильницамъ совѣ-

шуютъ

пуешъ имѣшь всевозможной покой, и наблюдашь крайнюю во всемъ предѣбережность взглядомъ своего благоповеденія: онѣ и ихъ прислужницы явспвенно тому прекословятъ и пропивурѣчатъ, сказуя на примѣръ той же роженицѣ тако: по что оспаваться заключенной во уединеніи?— По что не приниматъ и къ себѣ недопускатъ никого?— По что въ скукѣ препровождать время, когда роженицѣ и безъ того тошно и грусно?— Дѣша, нынѣ врачемъ вамъ предписанная, крайнѣ не кспати.— Строгое во всемъ содержаніе можетъ вамъ причинитъ крайнее силъ оскудѣніе, и привести васъ еще въ большую, слабость и изнеможеніе.— Лихорадки молочной вамъ страшишься не должно, она сама собою благополучно минуется.— Вонъ! шаковы по врачи и лѣкари.— Они сами незнаютъ, что другимъ баютъ.— повѣрьте мнѣ.— Я гораздо больше и лучше всѣхъ ихъ сіе вѣдаю. Я, которая ежедневно посѣдая женъ раждающихъ чрезъ столько лѣтъ, сама искусилася многочисленными опытами.— Позвольте пріятельницамъ вашимъ себя видѣть.— Не опасайтесь ничего.— Положитесь во всемъ на меня, и на мое давнее необманчивое искусство.— Покушай, сударыня моя! опивѣдай, испій не множко, чего изволишь.— Можно ли жить, ни ѣвши ни

пивши до сыта? — Поѣжъ матушка до сыта. не слушай никакихъ врачейскихъ приказовъ, и не бойся ихъ пустыхъ угрозъ. — Тако умничаютъ бабки мнимыя. А что ими сказано, то немедленно и дѣлано. Позволяется невозбранный входъ всемъ знакомицамъ, роженицу видѣть жаждущимъ: начинающъ ясти, пити и веселилися: развеселилися шумятъ, кричатъ, припѣваютъ; и здѣлавшия поощважнѣе, подносятъ смѣло и самой родильницѣ чашъ по сего, по другаго кушанья: пошчивающъ виномъ и другими разгорячительными напитки, и всячески еѣ къ тому уговаривающъ. Роженица, опѣ того содѣлавшия повеселее, имъ кажется внѣ всякой опасности. А по томъ уже не перестаютъ хвалить споль искусную бабку, сколь и добрую прислужницу. Чтужъ потомъ ночь наспушаетъ: гости расходяся: боль въ головѣ у роженицы раждаеся: жаръ во всемъ тѣлѣ умножается: лихорадка опѣ часа на часъ усиливается: всѣ, окружающіе роженицу, встревожены будучи, незнающъ и недоумѣвающъ, что дѣлать, и что начать? съ поспѣшностію приглашаютъ врача: рассказываютъ ему небылицу, и говорятъ не то, что съ родильницею приключилось: но во все тому противное. Счастлива роженица! если приз-

ванный врачъ, долговременнымъ опытомъ иску-
сившись, самъ отгадаетъ сущую правду, ко-
торую передъ нимъ сокрытъ и утаить спа-
раются, и употребитъ всевозможныя мѣры.
Такова то бываетъ участь большей части
роженницъ, кои безъ разбору слушаютъ не-
смысленныхъ бабокъ, нерадящихъ о собствен-
номъ своемъ и ихъ благоповеденіи.

Въ разсужденіи сего весьма нужно наблю-
дать правила, ко предъохраненію здравія и
благоповеденію родильницъ относящіяся; кои
суть не многія, и состоящія въ нижеслѣдующихъ
крапкахъ слѣдующихъ.

I. Покой и сонъ, для каждой родильницы есть милѣе и пріятнѣе всего на свѣтѣ. Въ самомъ дѣлѣ онъ бываетъ необходимо нужнымъ и полезнымъ для возстановленія и ободренія ея силъ потерянныхъ. Чѣмъ долѣ роды продолжались, и чѣмъ тяжелѣе были, тѣмъ нужнее сонъ роженицъ. Чего ради по окончаніи родовъ, надлежитъ немедленно, покрывъ все ея тѣло теплыми простынями, на нѣскольکو времени оставить въ покой, дабы она послѣ предшедшихъ трудовъ отдохнула и опочила, а особливо когда она весьма ослабѣла, или буде потчасъ по разрѣшеніи онѣмъ бремени прійдетъ на неѣ глубокій сонъ. При чемъ должно чаще осведомяясь о ея состояніи. И если сонъ долго продолжился, то мало по малу, а не вдругъ еѣ пробужать. Еслижъ роженица въ родахъ не много поспрадала, то немедленно, по вынятіи дѣтскаго мѣста, должно съ неѣ снять все бѣлье сѣрубашкою, когда оное смочено и вымарано, а на мѣсто онаго надѣть другое сухое, чистое, и теплое. Послѣ чего перенесши роженицу на пріуготовленную для неѣ постелю, покрывую многими сухими и нагрѣтыми простынями, въ чепверо свернутыми; дабы, какъ скоро верхняя мокротою смочится, то немедленно можно бы было оную

прочъ

прочъ опшуда снятъ , не тревожа и не поднимая самую роженицу, для подспиланія подъ неѣ новой. Чрево ея должно быть покрыто теплыми пологенцами, и все прочее тѣло по самую выю одѣтое тепловатыми, не весьма тяжелыми покровами. Для доставленія роженицѣ большого спокойствія и пріятнѣйшаго сна, надлежитъ изъ горницы, гдѣ она опочиваетъ, выслатъ всѣхъ излишнихъ людей; дабы они пустыми своими разговорами и шумомъ не могли еѣ потревожитъ, и причинитъ ея новое безпокойствіе.

II. Постеля для роженицы должна быть спокойная, просторная, ни чрезмерно теплая, ни весьма холодная, поставленная въ горницѣ не жаркой, ни холодной, но умеренно теплой, а при томъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ сквознаго вѣтра, не близко дверей, и подалѣ отъ окошекъ. Смоченныя простыни немедленно снимать съ постели; потому, что мокрота, сырость и нечистота весьма вредятъ роженицамъ. Постелю перестилать не прежде, какъ развѣ по прошествіи 24 часовъ, т. е. когда роженица уже въ силахъ будетъ привставать, и поощждать, пока постелю для нея переспелютъ. Но и въ то самое время всячески беречь ея грудь, ноги, руки, голо-

ву и прочія части, дабы отъ холоду не простудилися: и на постелю ложиться не прежде, какъ когда уже она порядочно нагрѣта и накурена будетъ. Все сіе надлежитъ исправлять, сколь можно, скоро и проворно.

III. Положеніе роженицы въ постелѣ должно быть горизонтальное. Она повинна лежать на спинѣ прямо пропнявшись, не корчась ногъ, но всегда оныя держать прямо пропнянутыми, и лежащими одна близь другой, но такъ, чѣмъ конечности ногъ были нѣсколько ниже ея головы; и въ семъ положеніи пребываешь, сколько ей возможно, по крайней мѣрѣ чрезъ цѣлыя 24 часа непремѣнно. Новорожденное дитя омытое и повивное положишь близь неѣ на постелѣ на нѣкоторое время.

IV. Горница для роженицы приличествуетъ такая, когда она не весьма велика и пространна, ни весьма мала и тѣсна, также не низка, не сыра, не чрезмѣрно холодна, ни излишно нагрѣта, но умеренно тепла, суха, и чиста. Чего ради никогда не должно позволять, дабы въ ея горницѣ мыли полы, либо вымывали оную мѣлами, а еще и того менѣе, полоскали дѣтскія пеленки или другое бѣлье, и шамъ оное вѣшали и просушивали. Въ холодное зимнее время по-

цѣпъ

пить горницу чаще но не излишно ; ибо жаръ или неумѣренная теплота, равно какъ неумѣренная мокрота и сырость роженицамъ весьма вредными бываютъ. Лѣпомъ и въ хорошую теплую погоду , когда въпра нѣтъ , можно днемъ растворять въ ея горницѣ одно окошко, но не ночью. Во всякое время крайнее прилагать стараніе, о возобновленіи чистаго , свѣжаго , здороваго и благораспорядка воздуха , и всегда беречися того , чтобъ случайно ей не простудилась, дабы кровоочищеніе послѣ родовъ бывающее , скоропостижно не прекратилось.

V. Воздѣланіе новорожденнаго младенца матернею грудью, есть первѣйшій долгъ, природою на каждую мать возлагаемый. Чего ради каждая роженица повинна вскармливать дитя свое собственными сосцами , и давать ему сосать оныя, какъ скоро опъ перваго сна пробудится. Время къ сему не опредѣляется. Можно ей обождать 12 часовъ послѣ родовъ. Чѣмъ ранѣе она начнетъ давать младенцу сосать грудь свою , тѣмъ лучше и полезнѣе сіе какъ для нея самой , такъ и для ея младенца. Сосцы тогда умеренно будучи напряжены первороднымъ , тончайшимъ, сладкимъ и цѣлительнымъ млечкомъ,

ВМѢ

имѣющѣ и сосочки грудныя не весьма вспухшіе; а потому и дитя своими уснами свободно оныя захватывающѣ, и млеко высасывающѣ можетѣ. Худо дѣлающѣ шѣ матери, кои нарочно выцѣживающѣ изѣ сосцовѣ сѣ первое млеко, и оное прочѣ бросающѣ, какѣ бы вредное и непотребиое. А еще и того хуже поступающѣ, кои долго откладывающѣ сѣ полезное естественное дѣло, и заспаваяющѣ своихѣ дѣтей долговременно посипишѣся. Чѣмѣ долѣ грудей имѣ сосать не дающѣ, шѣмѣ болѣ оныя млекомѣ напрягающѣся. А млеко долговременно вѣ сосцахѣ хранимое, поршишѣся, киснешѣ, спвороживаетѣся, и бываетѣ вредно и матери и мааденцу. Опшуду сильныя молочныя лихорадки, огневицы, горячки и другія грудныя болѣзни имѣющѣ свое начало; коимѣ ни когда подвержены не бывающѣ шѣ истинныя матери, которыя собственнымѣ млекомѣ своимѣ новорожденныхѣ дѣтей своихѣ рачительно и добропорядочно воспитывающѣ.

VI. Повязки чревныя, коихѣ многія роженицы сшоль усиленно ошѣ бабокѣ пребующѣ, и просажѣ, дабы ими чрево пошчасѣ послѣ родовѣ перевязано было, могутѣ имѣть мѣсто тогда, когда роды были тяжелые и

долго

долго продолжались: и когда опасность предвидится, дабы мапка отъ разслабленія вонъ не выпала. Но при перевязкѣ надлежитъ весьма беречься того, дабы чрево у роженицы не крѣпко и не туго повязками спянушо было. Въ противномъ случаѣ чревныя мѣшцы будучи сожаты и сдавлены, теряютъ свое дѣйствіе, а отъ того и самая мапка въ недѣйствіи оспаешся.

VII. Грудныя повязки только нужны тѣмъ роженицамъ, кои сами своихъ дѣтей кормить не могутъ, не хотятъ, и лѣнятся. Въ прочемъ однакожъ, сама ли роженица кормитъ свое дитя, или нѣтъ; всегда нужно хранишь груди отъ простуды, покрывая оныя сверху сухою хлопчатною бумагою, или бѣлками, или легкими льняными и теплыми полотенцами, нѣсколько разъ свернутыми и сахарнымъ дымомъ накуреными; и какъ скоро оныя испекающимъ млеко смочены найдутся, то немедленно на мѣсто мокрыхъ перемѣнять сухіе, чистые и теплые: безъ нужды сосцовъ не раскрывать, но только тогда, когда дитя сосать захочетъ, дабы холодный воздухъ открытымъ сосцамъ вреда не причинилъ.

VIII. Пища для роженицъ долѣетъ самая тонкая, не много питательная, желудка не

часть IV. Б обре-

обременяющая, напр: свѣжія яйца, буліонъ или похлебки шонкїя, съ шеляпиной, курицей, зелѣмъ, перловою, ячменною или овсяною крупю прїуготовленныя; коими надлежитъ ей довольствоваться, пока молочная лихорадка совершенно минуетъ. Въ пищѣ можно ей употреблять зеленой чай, чистую воду переваренную со смягчительными правами; и крайне беречися всего того, что горячитъ, и приводитъ кровь въ волнованіе. Во время молочной лихорадки употреблять такое пищѣ, коимъ испареніе или легкое исхожденіе паровъ поспѣшествуется. По окончаніи оной лихорадки позволяется родильницѣ употреблять купанье больше питательное, какъ то, жареную шеляпину, баранину, цыпляца, куры, рябчики и прочая: также пищѣ кофе, шоколадъ, и спарое виноградное доброе вино съ водою смѣшанное. Роженица, сама своею грудью питающая дитя свое, можетъ употреблять больше пищи и пищья, выключая только пищу сольную; попому, что по примѣчаніямъ кавалера Линнея, отъ того цынга во младенцахъ рождается: и вставать съ постѣли, какъ скоро укрѣпится.

IX. Обыкновенныя телесныя испраженія, какъ то: испареніе, испраженіе низомъ и проч.

все.

всегда у роженицы должны быть умѣренны и добропорядочны. Въ первые дни послѣ родовъ не должны онѣ съ поспѣли вставать для испражненія или испускающа мочи: но испражняясь въ сосудъ, нарочито подъ нихъ тогда подставляемой. Если въ первые дни случится у роженицы запоръ, тогда нужно ей часто наставлявать смягчительныя промывательныя. Легкое паровъ исхожденіе есть весьма полезно роженицамъ; чего ради надлежитъ оному поспѣшествовать умѣренною горничною и поспѣшною теплотою, частымъ питьемъ чаю, ромашковыхъ или самбуковыхъ цвѣтшвъ и проч. Жаръ неумѣренный, тяжелыя одѣялы, шубы, и разгорячительныя напитки для роженицъ вовсе не годятся; потому, что отъ всего сего раждается сильная испарина, и потъ; отъ чего иногда роженицы приходятъ въ крайнее разслабленіе. Не меньше для нихъ вреденъ и холодный воздухъ, или внезапная перемена изъ теплоты на спужу; поелику отъ того нечувствительное паровъ исхожденіе въ теплѣ внезапно прекращается; а потому роженица нечувствительно просудиться, и слѣдственно многимъ болѣзненнымъ припадкамъ легко подвержена быть можетъ.

Х. Лѣкарства легкія слабибельныя роженицамъ давать надлежитъ не прежде, какъ по совершенномъ окончаніи кровоочищенія, послѣ родовъ бывающаго. Смотри по обстоятельству, и по врачебному показанію, иногда нужно оныя имѣ и повторить. Тѣмъ, которыя кормящъ дѣтей, слабибельныя не нужны: промывательныя слабибельныя для нихъ всего нужнее: а напослѣдокъ крѣпительныя имѣ приносятъ великую пользу; укрѣпляя, ободряя, и воспанавливая силы ихъ ослабѣвшія или прежде потеряныя. Вишнія лѣкарства, особливо тепловатыя припарки, смягчительныя мази, также разбивающія и заживляющія, съ потребными къ тому повязками, почищаются нужными вообще тогда, когда роженицы долго мучились трудными родами: когда при томъ употреблены были извѣстные орудія или бабичьи повороты: и когда отъ того пришибы или поврежденіе дѣтороднымъ частямъ причинено было. Многія роженицы, особливо модныя госпожи, крайне желаютъ того, дабы чрево ихъ благовонными мазями часто смазывано было. Сіе онѣ дѣлаютъ въ томъ намѣреніи, дабы сохранивъ гладкость кожи, и отвратишь морщины, и жилонатяженіи, иногда уроженицъ послѣ родовъ, отъ раз-

разриву маленькихъ кровеносныхъ сосудовъ рождающіяся. Но признаться должно, что ни душистые мази, ни разнообразныя повязки, въ семъ случаѣ употребляемыя, не могутъ ихъ совершенно отъ того освободить. Иныя ради сего прикладываютъ себѣ къ живому кожу паргаментовую, въ водѣ размоченную: но и сіе выдуманное средство никакой почти пользы, кромѣ одного безпокойствія имъ не приноситъ. Теплые сухіе полотенцы часто къ живому прикладываютъ, составляющъ наилучшее предохранительное отъ того лѣкарство. Омовеніе тѣла, а паче дѣшордныхъ частей теплотою, со смягчительными травами опваренною водою, смѣшанною съ небольшимъ количествомъ краснаго винограднаго вина, также купанье и сидѣнье въ теплой ваннѣ молочной и водяной, иногда для роженицъ, паче другихъ лѣкарствъ нужнее и полезнее бываетъ, только бы не въ то время, когда роженица потѣетъ, употреблено было.

XI. Спокойствіе тѣла и духа для роженицы есть то, что душа тѣлу. Оно то со благоумѣренною теплотою составляетъ наилучшее и надежнѣйшее для нихъ крѣпительное лѣкарство. Не только для нихъ нужно и полезно спокойно опочивать во своей постелѣ,

по крайней мѣрѣ чрезъ 7 или 9 дней сряду: но припомъ вовсе опложить и оспавить всѣ суепы и заботы домашнія. Все сіе пѣмъ нужнае для роженицы, чѣмъ больше она родами мучилася, чѣмъ больше поспрадала, чѣмъ слабѣе она находится, и чѣмъ сильнѣе кровоочищеніе у неѣ продолжается. По окончаніи кровоочищенія, можетъ она вставъ съ постели, тихо похаживать по горницѣ, но никогда не продолжатъ пѣлдвиженія даже до успалости: однакожъ никакъ не должна она выходить или выѣжжать изъ дому на открытой воздухъ прежде исполненія 3 или 4 недѣль послѣ родовъ, особливо зимою. Сіе разумѣется большею частію онѣжныхъ городскихъ господахъ.

XII. Спраспи, или сильныя возмущенія душевныя, сполько для роженицъ зловредны и бѣдотосны, сколько спокойный духъ есть имъ полезенъ. А паче всего неумѣренная печаль и сѣпованіе, гнѣвъ и ярость, крикъ, вопль, смѣхъ, страхъ и переполохъ, часто ввергаютъ роженицъ въ превеликую опасность. Чего ради надлежитъ имъ всячески оныхъ беречися, и всѣми мѣрами отвращать и укрощать всѣ шакковыя пристрастія. Равномѣрно и окружающія родильницъ сродники, рабини, и прислужницы должны всегда крайне предъосперегать себя отъ пюго, дабы

дабы роженицѣ отнюдь не сказывать никакихъ непріятныхъ и печальныхъ вѣстей, и оными еѣ не устрашать; особливо, еслибы чпоні-есць прошивное или неблагополучное, въ разсужденіи ея домовства и хозяйства нечаянно приключилося. Сверхъ того ни когда не должно позволять входить къ роженицѣ въ горницу такимъ лицамъ, коихъ присутствіе могло бы навести ей скуку, отвращеніе, и безпокойствіе, либо коихъ она отнюдь терпѣть не можетъ.

ХII. Одѣяніе роженицѣ должно быть легкое, спокойное, не тѣсное, не узкое, не тяжелое, годичному времени сообразное, и состоянію ихъ приличествующее. Зри о сѣмъ Ч. III. Вступленія спатью IV.

Въ прочемъ сколь бы велико попеченіе о роженицахъ прилагается ни было, нельзя поему спаться, чтобъ которая нѣсѣтъ изъ нихъ не могла участвовать въ ихъ болѣзненныхъ припадкахъ, кои обыкновенно роженицамъ, ш. е. женамъ, отъ бремени дѣннорожденія разрѣшившимся, обыкновенно приключаются, и о коихъ порознь въ послѣдующихъ главахъ объясняется.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

О БОЛѢЗНЯХЪ, КОИ РОДИЛЬНИЦАМЪ
ПОСЛѢ РОДОВЪ ПРИКЛЮЧАЮЩІЯСЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О кровоочищеніи родильницы и прекращеніи
онаго.

I. Кровоочищеніе.

1. Кровоочищеніемъ называется то, когда у роженицы послѣ родовъ настоящая кровь со клейкими мокротами смѣшанная изъ самихъ нѣдръ матки чрезъ ея рукавъ вонъ истекаетъ.

2. Причиною сего кровоочищенія суть частію разверстые и зѣяющіе устѣйцы кровеносныхъ сосудовъ, по отдѣленіи дѣтского мѣста отъ матки, не скоро затворяющіеся: а частію многокровоіе, найпаче послѣ родовъ по всему тѣлу роженицы распростирающееся.

3. Начало, и окончаніе сего кровоочищенія, не всегда есть одинаковое. Оно обыкновенно потчасъ по рожденіи младенца, и по вынятіи

его

его мѣста изъ матки, печь начинаетъ въ видѣ свѣтло-красноватой крови, и въ довольномъ изобиліи. По прошествіи нѣсколькихъ часовъ оное умалается: истекающая кровь перемѣняемая цвѣтомъ: бываетъ блѣдно-красноватою, а на послѣдокъ со всѣмъ блѣдною. Оно мало по малу перемѣняемая цвѣтомъ, отъ часу на часъ умалается и количествомъ: иногда оно перестаетъ со всѣмъ на третій день: иногда даже до пяти или шести сутокъ продолжается. Послѣ чего оно бываетъ похожее на сукровицу, или на пакую воду, въ коей свѣжее мясо или говядина вымыта была. Что и продолжается еще чрезъ нѣсколько дней. А на послѣдокъ бѣловатая, клейкая, однакожъ отъ млека совершенно опличная мокрота еще чрезъ нѣ-нѣсколько времени вонъ испекаетъ, пока со всѣмъ прекратится.

4. Продолженіе и количество сего кровоочищенія нельзя точно опредѣлить. У однихъ роженицъ оно продолжается дольше, а у другихъ короче. У иныхъ больше, а у другихъ меньше крови испекаетъ. Не рѣдко у нѣкоторыхъ оно чрезъ 3 или 4 недѣли продолжается. Обыкновенно оно гораздо скорѣе прекращается у тѣхъ роженицъ, кои сами собственною грудью дѣтей кормятъ, и у коихъ передъ

пѣмъ сильное кровоизліченіе случилось. Въ прочемъ сколько бы оно ни продолжалось; но если роженица здорова находится: если она не чувствуетъ ни какой внутренней боли: если у ней нѣтъ лихорадки: если чрево ея не распухло и не затвердѣло; то никакая помощь и лекарствъ ей не нужны; развѣ оно случается прекратится.

II. Прекращеніе кровоизліченія.

5. Кровоизліченіе у родильницъ прекращается двоякимъ образомъ: а именно, натурально либо случайно: при томъ, либо топчасть по окончаніи родовъ: либо чрезъ цѣлой день порядочно и въ довольномъ количествѣ теченіе оного продолжается, по томъ на другой день вдругъ унимается, или скоропоспѣжно прекращается.

6. Кровоизліченіе, топчасть или вскорѣ послѣ родовъ прекратившееся, гораздо есть опаснѣе того, которое по прошествіи 24 часовъ внезапно прекращается. Первое всегда бываетъ сопряжено со многими припадками, кои суть сіи: жестокая лихорадка безпрерывно продолжающаяся, препешаніе сердца, корча и судорога, глубокій сонъ, надменіе и напыщеніе чрева, жестокая боль въ немъ

немъ ощущаемая неутолимая жажда, главоболѣніе, и напряженіе сосцовъ. А во вѣсѣ случаѣ рѣдко сіи припадки роженицею ощущаются.

7. Причины сего припадка главнѣйшія сунтъ сіи: 1) вожженіе отъ пришибовъ или поврежденія мапки, въ тяжелыхъ натуральныхъ родахъ воспослѣдовавшее. 2) спужа или простуда вишняя или внутренняя. 3) сильныя возмущенія духа, а наипаче печаль, гнѣвъ страхъ и проч. 4) обяденіе или неумѣренное пици и питья употребленіе, и опшуду происходящее надменіе и напыщеніе живота. 5) повязки, коими чрево шуго у роженицы послѣ родовъ спянуто было. 6) сильный запахъ, пріятный или противный. 7) вяжущія лѣкарства.

8. Если при случившемся прекращеніи кровоочищенія никакіе изъ упомянутыхъ (6) припадковъ у роженицы не оказываются; въ такомъ случаѣ предѣоспавляя все дѣло природѣ, надлежитъ шолько ей предписать добропорядочное діешы наблюденіе, и содержащъ себя въ надлежащемъ покоѣ и шеплошѣ. Еслижъ оныя припадки въ самомъ дѣлѣ окажутся, што должно опвращать ихъ различными средствами заблаговременно: напрімѣръ,

смотря по встрѣчающимся обстоятельствамъ, кровопусканіемъ изъ руки или изъ ноги: тепловатыми припарками къ животу прикладываемыми : смягчительными промывательными : и внутренними прохлаждающими, потовыми, боль уполяющими, и судорогамъ сопротивляющимися лѣкарствами.

Еслижъ прекратившееся кровоочищеніе обратится къ которой нѣсть тѣла части, и тамо произведетъ нарывъ; въ такомъ случаѣ нужно поступать по правиламъ лѣкарской науки; о чемъ въ послѣдующихъ главахъ объяснено будетъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О переймахъ случающихся послѣ родовъ.

9. Переймы, или перехваты послѣ родовъ у родильницы случающіеся, суть не что иное, какъ родовая боль, отъ сокращенія матки, въ нижней чрева части раждающаяся.

10. Причиною сего припадка есть либо кровь запекшаяся, либо части дѣтского мѣста, или цѣлое мѣсто внутрь матки по выходѣ младенца остающееся. Таковые переймы тѣмъ бываютъ сильнѣе, и тѣмъ долѣе про-

продолжаются, чѣмъ большее и сильнѣйшее есть препятствіе, сожимающейся маткѣ сопротивляющееся; и пока въ нижней чрева части твердость ощущается.

11. Предъосторожность для роженицы, во время дѣйствія таковыхъ переимовъ нужная, состоитъ въ томъ, дабы она имъ пособляла точно такимъ же образомъ, какъ и тогда когда истинные перехваты передъ родами дѣйствуютъ: т. е. она должна всячески стараться, задерживать въ себѣ дыханіе, не надуваться, не кричать, и никакимъ образомъ онымъ не сопротивляясь; при чемъ надлежитъ снаружи имъ пособлять легкимъ преніемъ живота, посредствомъ тепловатой суконки, байки, или рукою.

12. Опыты доказываютъ, что тѣ роженицы, кои еще въ первой разѣ родили; такъ же и тѣ, у коихъ дитя родилось ножками, либо оными поворотено, и рукою благополучно вынято было, рѣдко послѣ родовъ переймамъ бывають подвержены, либо по меньшей мѣрѣ оныя не часто случаются. Напротивъ того, чѣмъ чаще родильница раждала, чѣмъ больше дѣшей имѣла, и чѣмъ косвеннѣе есть положеніе матки: тѣмъ сильнѣйшіе переимы послѣ родовъ случаются, и тѣмъ чаще оныя мучашъ родильницу.

13. Врачебное попеченіе объ отвращеніи переимовъ, по рожденіи младенца случающихся, едва нужно; поелику они приносятъ роженицамъ великую пользу, истребленіемъ всего того, что бы въ мащкѣ инородное ни оспалось. Однакожъ надлежитъ всегда предупреждать оныя благовременнымъ вынятіемъ опшуда дѣтского мѣса, запекшейся крови и проч. Въ прочемъ, когда переимы суть весьма жестокіе, и долговременно мучатъ родильницу; въ такомъ случаѣ много пользуют смягчительныя промывательныя, тепловатыя припарки, усыпительныя и боль уполяющія аѣкарства: а наипаче очищеніе мащки отъ всего инороднаго, въ ней оспающагося.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О млечной лихорадкѣ.

14. Млечная лихорадка рождается у родильницъ обыкновенно почти около шестяго дня по разрѣшеніи: ибо тогда сосцы начинаютъ весьма чувствительно напрягаться млескомъ въ изобильномъ количествѣ опдѣляющемся, и гораздо больше и твержѣ прежняго дѣлаются:

отъ чего и весьма чувствительная боль въ грудяхъ, ознобъ, помягота, бѣненіе боевыхъ жилъ скорое, и содроганіе отъ лопатокъ ко грудямъ и по всему тѣлу распространяющееся ощущаются.

15. Причиною млечной лихорадки есть не только большее прошиву прежняго спеченіе крови ко грудямъ: но и кровоочищеніе тогда явственнѣе умягчающееся начинающееся, а при томъ и то, что млечные протоки будучи упругими, трудно раздаются.

16. Начало, продолженіе и окончаніе молочной лихорадки не всегда бывающъ одинаковы. Обыкновенно она продолжается чрезъ 24 или 48 часовъ. Она бывающъ тѣмъ легчѣ и сноснѣе, чѣмъ больше сосцы разширяются: чѣмъ скорѣе въ нихъ млеко отдѣляется: и чѣмъ раниѣ даютъ сосать грудь новорожденному младенцу. Напротивъ того, чѣмъ большее есть сопрошивленіе млеку, во млечныхъ сосудахъ отдѣляемому, и чѣмъ больше и далѣе откладываютъ давать сосать грудное млеко: тѣмъ лихорадка сильнѣе бываетъ. Вообще она весьма жестокою дѣлается, долго продолжается, и больше свирѣпствуетъ въ тѣлѣ шѣхъ родильницъ, кои, будучи въ силахъ, своею грудью собственное дитя кормить отпрещаются, или лѣнятся.

17. Врачебная помощь едва есть нужною тогда, когда млечная лихорадка будучи легка и сносна, не имѣетъ при себѣ никакихъ худыхъ слѣдствій. Теплоша, спокойствіе духа, опочиваніе въ постелѣ, и частое младенцемъ сосаніе груди, суть надежнѣйшія средства къ совершенному ея отвращенію. При чемъ родильница должна довольствоваться тонкими похлебками, и часто употреблять питье производящее легкую въ ея телѣ испарину, или травы подъ No. II. предписанныя. Въ случаѣ великаго изобилія млека, нужно либо другое поспороннее дитя ко грудямъ прикладывать, либо выцѣживаешь опшуда млеко банками, или усами высасывать.

18. Припадки, обыкновенно почти всѣмъ роженицамъ, кои дѣшею своихъ грудью не кормятъ, приключаются суть многочисленны. Отъ изобильнаго спеченія млека, груди у шаковыхъ роженицъ чрезмѣрно раздуваются, и сосочки сильно напрягаются: отъ чего почти несносная боль рождается. Сверхъ того, млеко въ сосцахъ долго безъ движенія пребывающее, либо находитъ себѣ обратной путь къ тому началу, откуда оно произошло, и снова съ кровію смѣшавшись, причиняетъ жестокія горячки и огневицы: либо въ грудяхъ

киенешѣ, спвораживается, дѣлается острымъ и ѣдкимъ: опѣ чего въ сосцахъ рождаются жестокія зашвердѣлости, окрѣплыя опухоли, возгорѣніе, и еще сего злѣйшія бѣдспія и безпокойствія; коихъ вину иногда лъживо бабкамъ или врачамъ приписываютъ, будпо бы они молоко сквасили; и копорымъ припадкамъ роженицы, добропорядочно дѣшей своихъ собственную грудь вскармливающія, никогда подверженны не бывають.

19. Врачеваніе случившихся таковыхъ (18) припадковъ послѣшествуется либо пособіемъ скорѣйшему млека обращенію и смѣшенію съ кровію: либо благовременнымъ предбохраненіемъ и опвращеніемъ того, дабы оное не смѣшалось съ кровію. Сему наипаче благопріятствуетъ все вышепоказанное (17). Когдажъ сама роженица кормитъ младенца нехочетъ или не можетъ; такой нужно пуститъ кровь изъ руки или изъ ноги, смотря по обстоятельствомъ: имѣть строгое во всемъ воздержаніе; и снаружи къ болящимъ грудямъ прикладывать хлопчатую бумагу, сахарнымъ дымомъ накуренную, разбивающія теплыя припарки съ нужными тепловатыми и мягкими повязками, такъ же смягчающія мази и разбивающія пласпыри.

часть IV.

В

ГЛАВА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О жестокомъ кровотеченіи родильницъ.

20. Кровотеченіемъ жестокимъ, неумѣреннымъ или чрезвычайнымъ называется то, когда оное у роженицы послѣ родовъ непрерывно больше восьми дней безъ умаленія продолжается, или отъ часа на часъ усиливается. Известно, что при кровоочищеніи, не больше какъ около двухъ фунтовъ крови у родильницы истекаетъ: но если гораздо большее сего количество оной теряется, то такая жена въ великой опасности обрѣщается.

21. Причины такого болѣзненного кровотечения, изъ нѣдръ матки происходящаго, могутъ быть многоразличныя; главнѣйшія изъ нихъ сунтъ сїи: 1) матка по выходѣ младенца на свѣтъ, разслабѣвшая, и потерявшая сродную ей силу, кою она сжимается равномерно повсюду, и мало помалу приходитъ въ прежнюю свою величину. 2) инородное тѣло, послѣ родовъ въ маткѣ остающееся, и сжиманію ея сопрошивляющееся. 3) великій внутренній жаръ, или волнованіе крови, горячими напипками, и другими крѣпкими родогонительными, внутрь и вѣвъ, прежде или послѣ родовъ

родовъ употребленными лѣкарствами причиненное. 4) Приспраспѣя, или сильныя возмущенія духа. 5) раннее сообщеніе съ мужемъ. 6) поврежденіе, разрывъ, ниспаденіе, или дномъ внизъ вывороченіе матки. 7) нечистота въ задней кишкѣ затвердѣвшая, и передъ родами помощію промывательныхъ неочищенная.

22. Знаки и припадки, такое болѣзненное кровотеченіе изъвѣляющіе, суть сіи: 1) блѣдное лице уроженицы. 2) звонъ и шумъ въ ушахъ. 3) частая зѣвота. 4) дрожащій и ослабѣвающій голосъ. 5) хладныя и почти оледѣлыя руки и ноги. 6) малое и слабое боевыхъ жилъ бѣненіе. 7) боль и рѣзь въ животѣ умаляющееся. 8) слабость, омраки, и судороги. Изъ такихъ знаковъ, бабка или повивальный врачъ, неспрашивая у другихъ, безъ запрудненія могутъ отгадать настоящую сего причину, хопя бы имъ о томъ и не объявлено было.

23. Опасность для роженицы, сему припадку подверженной, тѣмъ есть большая, чѣмъ сильнѣе бываетъ кровотеченіе, чѣмъ долѣ оно продолжается, и чѣмъ больше вычисленныхъ (22) знаковъ совокупно встрѣчается: а когда еще при всемъ томъ всѣ оныя припадки оп-

нюдѣ неумалаяются, и кровотеченіе въ скоромъ времени оповращено не будетъ, то обыкновенно неминуемая ей смерть слѣдуетъ. А хотя роженица и избѣжитъ таковой опасности; однакожъ всегда бываетъ подвержена долговременной слабости шлѣсной, непрерывному главоболѣнію, медлѣнной лихорадкѣ и опоку ногъ, а при томъ чрезъ долгое время имѣетъ весьма блѣдное лице.

24. Врачеваніе сего припадка должно быть различное, смотря по различію причинъ онаго. Напримѣръ: 1) когда кровотеченіе у роженицы приключилось отъ первой причины (21. 1.): когда чрево ея и матка пребывающъ въ единомъ состояніи, ш. е. столькожъ разширенными, сколько и передъ родами были: когда при томъ кровь непрерывно изъ матки истекаетъ безъ всякихъ переимовъ; въ такомъ случаѣ надлежитъ подавать роженицѣ найскорѣйшую помощь, какъ внутренними такъ и внѣшними средствами, скорѣйшему сожатию и сокращенію матки способствующими; а наипаче часто слегка тереть животъ у роженицы рукою, или тепловатыми салфешками и суконками.

2) Когда кровотеченіе происходитъ отъ второй причины (21. 2): когда кровь иногда
въ

въ большемъ , иногда въ меньшемъ количествѣ, иногда затекшіяся кусками, иногда жидкая и свѣтло-красноватая, иногда темноватая или почернѣлая , либо подобная водѣ , въ коей свѣжее мясо вымыто было , изъ матки вонъ испускаетъ: когда чрево роженицы необыкновеннымъ образомъ надулося и выпучилоя: и когда сильныя переймы при томъ часто дѣйствуютъ; въ такомъ случаѣ вся помощь состоитъ въ томъ , дабы немедленно вынять искусно рукою изъ матки все шю, что бы въ ней послѣ родовъ ни оставалоя.

3) Когда кровоотеченіе воспослѣдовало отъ 3й, 4й, и 5й, причинъ; въ такомъ случаѣ, надлежитъ роженицѣ пустить кровь изъ руки, а внутренне употреблять охлаждающія и жаръ утоляющія лѣкарства. При чемъ родильница должна спокойно въ постелѣ опочивать въ такой горницѣ, въ коей воздухъ нѣсколько холодоватъ, и покрываться одеялами не весьма тепловатыми и тяжелыми.

4) Когда кровоотеченіе имѣетъ свое начало отъ 6й, причины, а именно отъ поврежденія матки; то оное благополучно само собою унимается вскорѣ послѣ того, лишь только существо матки отъ сожатиіа прійдетъ въ прежнюю свою величину. Когдажъ крово-

теченіе приключилося отъ выпаденія мапки; по оное прекращается скорымъ и исправнымъ мапки на свое мѣсто вправливаніемъ. на послѣдокъ

5) Когда кровотеченіе произошло отъ 7 й, причины: по оное смягчительными промывательными, часто наснавливаемыми, счастливо отворачивается.

25. Предвосторожность для роженицы, кровотеченіемъ страдающей, отъ какой бы причины оное ни воспослѣдовало, вообще состоитъ въ томъ, дабы она не только спокойно плѣломъ опочивала въ постелѣ, но и старалась бы имѣть спокойной духъ. При чемъ всегда должна она наблюдать строгое во всемъ воздержаніе: довольствоваться пищею и пишемъ, самымъ легкимъ, тонкимъ и не много питательнымъ; ежедневно имѣть добродетельное испражненіе низомъ; и для того наснавливать часто промывательныя; долго воздерживаться отъ плотскаго сообщенія съ мужемъ; и по совершенномъ прекращеніи кровотеченія употреблять ослицыно или козье млеко.

* * *

ГЛА.

О воспаленіи матки.

26. Воспаленіе, возженіе, или возгорѣніе матки приключается почти такимъ же образомъ, какъ и въ другихъ мягкихъ частяхъ человѣческаго тѣла. Но главнѣйшія онаго причины суть сїи: 1) роженицы внезапное паденіе, или ударъ снаружи учиненный. 2) поврежденіе матки, пришибы, или разрывъ ея рукава: что случается въ трудныхъ и сверхъестественныхъ тяжелыхъ родахъ. 3) цѣльное дѣтское мѣсто или только часть онаго, либо части спворожившейся крови и прочее, внутрь матки оспающіяся. 4) кровоочищеніе внезапно или скоро послѣ родовъ прекратившееся.

27. Знаки, по коимъ о воспаленіи матки, уже воспослѣдовавшемъ, удостовѣриться можно, суть сїи: 1) лихорадка ежедневная и непрерывно продолжающаяся. 2) Надменное у роженицы чрево сверхъ обыкновеннаго, и жестокая боль въ немъ ощущаемая. 3) опухоль и возженіе во внѣшнихъ мягкихъ женскихъ дѣтородныхъ частяхъ. 4) Запоръ мочи, или трудное и съ болью сопряженное мочи печеніе. 5) Запоръ въ животи, и долго-

временное неиспращеніе низомъ. 6) рыльце матки твердоватое, вспухлое, вожженное, отъ прикосновенія боль раждающее, и совершенно закупоренное. Напослѣдокъ когда ко всему сему еще посоединятся 7) шрудное дыханіе, тяжелое поглощеніе, рвота, судорга, корча и брѣженъе; тогда роженица, всѣмъ шаковымъ припадкамъ подверженная, въ самой крайней опасности, а иногда и недалече отъ смертной кончины находится.

28. Слѣдствія вожженія въ маткѣ случившагося, супъ тѣже, что и въ другихъ мягкихъ тѣлесныхъ частяхъ бывають. А именно: вожженіе матки можетъ имѣть четверакое окончаніе: ш. е. либо быть отвращено разгоняющими и разбивающими лѣкарствами: либо перемѣниться въ возгноеніе: либо превратиться въ Антоновъ огонь: либо окончиться омертвѣніемъ, или премѣною въ рака. Вообще объ немъ извѣстно, что чѣмъ ранѣе вожженіе матки послѣ родовъ приключилось, тѣмъ оное бываетъ опаснѣе и бѣдственнѣе.

29. Врачеваніе сего столь опаснаго припадка дспавляется различными способами. Напримѣръ: если вожженіе матки случилось отъ инороднаго шѣла, послѣ родовъ оставшагося, и еще

еще въ ней пребывающаго; въ такомъ случаѣ немедленно со крайнею бережностью оное опшуда вынестъ должно. Еслижъ найдено будетъ рыльце матки крѣпко сожатое и затворившееся: въ такомъ случаѣ лучше предъоставить природѣ испребленіе онаго, пособляя при томъ ея дѣйствию внутреннею и внѣшнюю шѣла теплотою и покоемъ. Въ прочемъ отъ какой бы причины воспаленіе матки ни произошло, смотря по обстоятельству роженицы, надлежитъ тому заблаговременно сопротивляться кровопусканіемъ изъ руки или изъ ноги утиненнымъ, смягчительными, промывательными, тепловатыми припарками, и внутренними разводящими, волнованіе крови утполяющими и прохлаждающими лѣкарствами. При чемъ нужно, дабы родильница всегда наблюдала строгое въ разсужденіи пищи, питья и прочаго воздержаніе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О омракахъ и судорогахъ.

30. Омраки и судорги часто роженицамъ приключаются не только передъ родами и въ самыхъ родахъ; но и непосредственно по скончаніи оныхъ.

31. Причины шаковыхъ припадковъ могутъ быть всѣ преждевычисленные (Ч. II. Гл. X.): а особливо кровопеченіе сильное вскорѣ послѣ родовъ случившееся: паденіе или ударъ въ чрево утробенный: кровоочищеніе внезапно прекратившееся: жестокія душевныя возмущенія и проч. отъ первой и послѣдней причинъ происходящіе припадки всегда сущь опаснѣе прочихъ.

32. Врачеваніе сихъ припадковъ совершается особливыми средствами; а имянно:

- 1) Когда омраки и судорги приключились отъ жестокаго кровопеченія: то оныя съ успѣхомъ отвращаются такими средствами, коими кровопеченіе унимается, и коими роженицѣ доставляется скорое ободреніе и возстановленіе силъ потерянныхъ.
- 2) Когда омраки и судороги приключились отъ паденія, а найпаче отъ удара головнаго; въ такомъ случаѣ надлежитъ немедленно

но

но роженицѣ оспричь и обрить всю голову, и къ ней часпо прикладывать припарки тепловатыя, состоящія изъ шравъ душистыхъ и разбивающихъ подѣ №. 29. означенныхъ, а при томѣ пустить ей кровь изъ ноги, иногда и повторить кровопусканіе.

3) Когда омраки и судороги имѣютъ свое начало отъ кровоочищенія, скоропоспѣжно прекратившагося; то оныя благополучно отворачаются разводящими, растворяющими, пропускными и прохлаждающими лѣкарствами, и кровопусканіемъ. Напоследокъ

4) Когда омраки и судороги случаются у роженицы отъ жестокихъ пристрастій или душевныхъ возмущеній; тогда пользуютъ легкія слабительныя, противусудорожныя, усыпительныя, разводящія, и промывательныя смягчительныя лѣкарства, кровопусканіе изъ руки, и совершенное обузданіе неумѣренныхъ спрасей и прихотей.

33. Надежда о совершении въ выздоровленіи роженицы, частыми омраками и судорогами спраждуемой, есть не малая, если она между или послѣ таковыхъ припадковъ приходитъ въ себя, и получаетъ прежнее свое чувство.

О разрывѣ , поврежденіи , и пришибахъ
дѣтородныхъ женскихъ частей.

I. Разрывъ дѣтородныхъ частей.

34. Разрывъ внѣшнихъ мягкихъ дѣтородныхъ частей женскихъ не рѣдко случается во время родовъ: а особливо самое начало рукава матки , и промежность между дѣтородными частями и заднимъ проходомъ , разрываючися такъ , что иногда такой разрывъ онаго мѣста просширается даже до круговой сжимающей заднюю кишку мышцы : а иногда и самая та мышца , и начало задняго прохода раздираючися ; отъ чего рождается большое стверспіе или великая разщелина , отъ верхней большихъ губъ спайки до самого задняго прохода продолжающаяся.

35. Причины такового разрыва (34) могутъ быть сіи: 1) чрезмѣрная величина дѣтской головки. 2) кости головного черепа торчащія , когда дитя давно умерло. 3) упругость и негибкость дѣтородныхъ частей , особливо у пожилыхъ женъ , кои будучи въ лѣтахъ еще въ первой разѣ очреватѣли. 4) нерадііе бабки и небреженіе о томъ , дабы во время
дѣй-

дѣйствія переймовѣ рукою поддерживавшъ промежность, между дѣтородными частями и заднимъ проходомъ обрѣтающуюся. 5) неискусное рукоиспытаніе, или безразсудная бабичья ухватка, т. е. когда акушеръ или бабка рукою или орудіями вынимали дитя изъ утробы не такимъ образомъ, какъ надлежало.

36. Опасность тѣмъ есть меньше, чѣмъ разрывъ есть непримѣнѣ. Разрывъ будучи невеликъ, почти не требуетъ лѣченія. Мѣсто много поврежденное часто само собою и силою природы соединяется и заживаетъ. Безпокойство для беременной есть только единое сѣ, что когда она мочится, то въ то самое время ощущаетъ боль въ поврежденномъ или раненномъ мѣстѣ, истекающею мочою причиняемую. Когда поврежденіе есть великое, такъ, что разрывъ проспирается отъ дѣтородныхъ частей даже до самого задняго прохода; въ такомъ случаѣ боль тѣмъ причиняемая, бываетъ гораздо чувствительнѣе: роженица часто спраждаетъ запоромъ: и рана будучи опаснѣе, сама собою зажишь и соединиться не можетъ, но требуетъ помощи отъ лѣкарскаго искусства.

37. Врачеваніе тѣмъ есть нужнѣе, чѣмъ рана есть больше. 1) когда разрывъ случился

ся такъ великъ, что и задняя кишка повреждена: въ такомъ случаѣ раздѣленные части соединяющіяся швомъ кровавымъ, ш. е. наведенною ниткою, съ помощію кривой иглы ушитымъ. 2) когда разрывъ есть едва приметнымъ, и края у раны уже зашвердѣли, или мозолистыми содѣлались; тогда прежде сшивки нужно сперва, мозолистое прочь опияшь, или рану снова учинить, а по томъ уже оную надлежащимъ образомъ зашить. 3) когда роженица опиюдъ не соглашается, дабы у нѣе сшивали рану швомъ кровавымъ: то можно употребить шовъ сухой, ш. е. посыпавъ края у раны канифолью, въ мѣлкой порошокъ растертою, соединить оную вяжущимъ пластыремъ. 4) когда рана уже сшита и соединена, тогда роженица должна спокойно лежать въ постелѣ по крайней мѣрѣ чрезъ цѣлую недѣлю или больше: во время испусканія мочи и испражненія низомъ опиюдъ не надуваться: всячески предъохранять себя отъ чиханья, кашля и рвоты: испражненію низомъ пособлять смягчительными промывательными: не употреблять ничего такого, что горячитъ: и довольствоваться пищею тонкою, жидкою и пипательною.

II. Поврежденіе дѣтородныхъ частей.

38. Поврежденіе внѣшнихъ дѣтородныхъ частей, и самого рукава матки, часто причиняется величиною головки, женскому тазу несоразмѣрной, и долго въ одинакомъ положеніи пребывающей: поюжъ дѣтскою головкою весьма косвенно лежащую: бабичьими руками, оспрыми ногтями или орудіи, небрежно дѣтороднымъ частямъ касающимися.

39. Врачеваніе такового поврежденія предпріимается симъ образомъ: 1) когда только верхняя кожа въ рукавѣ матки повреждена: то для предѣохраненія, дабы внутренняя онаго поверхность передняя и задняя между собою нерослися, нужно запусить въ самой рукавѣ матки особливую трубочку, масломъ смазанную, и многія по сторонамъ ошверстія имѣющую, дабы гнойныя микроты сквозь оныя свободно вонъ выпекашь могли; а по томъ, если нужда воспребуеиъ, и повязкою чрево у роженицы перевязать, чшобъ такая трубочка не выпала. Въ семъ случаѣ наипаче время и терпѣніе приносятъ совершенное исцѣленіе. 2) когдажъ внутри поврежденныхъ частей содѣлаются опухоль или нарывъ, что легко можетъ случиться какъ отъ внутренней те-

плоты, какъ и отъ гнойныхъ мокротъ, безпрерывно тамо умножающихся; въ такомъ случаѣ надлежитъ спараться о томъ, дабы таковыя опухоли скорѣе созрѣли, и возгноилися; а по вскрытіи и очищеніи оныхъ, раны и язвы искусно уврачеваны были.

III. Пришибы въ дѣтородныхъ частяхъ.

40. Пришибы въ мягкихъ внутреннихъ дѣтородныхъ частяхъ найпаче причиняются акушерскими орудіями, не осторожно въ трудныхъ родахъ употребляемыми. На пришибенныхъ мѣстахъ иногда рождаются мѣшечки, пузырьки или опухоли темно-красноватыя, кровію наполненныя. Однакожъ нерѣдко таковая опухоль рождается отъ весьма сильныхъ переимовъ, отъ непомѣрной величины дѣтской головки, и отъ весьма косвеннаго ея положенія.

41. Мѣсположеніе таковой кровяной опухоли можетъ случиться на внутренней поверхности дѣтородныхъ большихъ губъ, по срединѣ рукава матки и около мочеиспускательнаго ствола, и на послѣдокъ въ самой верхней части рукава и вокругъ рыльца матки.

42. Пришибы, поврежденіе или разрывъ, въ боевыхъ сосудахъ, вышеобъявленными (40)

прили-

причинами учиненные, производятъ разлитіе крови; которая изъ разорванныхъ жилъ вытекаетъ, и разлившись между покрововъ, внутреннюю поверхность дѣтороднаго уда отдѣляющихъ, безъ движенія тамо пребываетъ, пока сама себя пуши не откроетъ, и вытечетъ; либо искусствомъ опшуда вышущена будетъ.

43. Опасность шѣмъ есть меньше, чѣмъ меньше числомъ и величиною шакowychъ пухляковъ находишься. Когда онѣ суть малы, и при самомъ началѣ рукава машкѣ обрѣзающагося, тогда нѣтъ почти никакой опасности. Когдажъ ихъ очень много: когда онѣ очень велики: когда высоко въ рукавѣ машки случаются: и когда большіе кровеносные сосуды повреждены или разорваны были: то шѣмъ большую представляющъ опасность, чѣмъ больше шакowychъ обстоятельствъ вмѣстѣ воспрѣчается.

44. Врачебная помощь состоитъ въ слѣдующемъ: 1) когда шакочная кровавая опухоль случится при началѣ рукава машки, то немедленно по окончаніи родовъ оную вскрышь, кровь выпустить, и рану искусно залѣчить должно. Въ противномъ случаѣ, если роженица не позволишь, дабы у ней шакочная опухоль

холь вскрыпа и разрѣзана была: по она превращается въ нарывъ, въ коемъ кровь въ гной премѣняется, и лѣчение онаго весьма медленнѣе къ концу приводится. 2) когда такіе кровяные пузырьки находятся повнѣшнѣе вниутрь рукава мапки: по нерѣдко случается, что оныя, дѣтскою головою внизъ опускающеюся, во время родовъ сожаты и раздавлены будучи, прорываются, и изъ себя выпускаютъ настоящую кровь, часно какъ при родахъ, такъ и по окончаніи оныхъ вонъ истекающую. Въ прочемъ такое теченіе крови не только роженицамъ не вредитъ, но напротивъ того много имъ пользуетъ; ибо теплою и влажностію смягчая мягкіе дѣпородныя часни, много способствуетъ скорѣйшему и благополучнѣйшему родовъ окончанію; а рана отъ того воспослѣдовавшая, силою и дѣйствіемъ природы, вскорѣ сожавшись, заживляется и совершенно исцѣляется.

*

*

*

О выладеи и вывороченіи матки, ея рукава, и низладеи згнней киши.

I. Выладеи матки.

45. Выпадеи матки у родильницъ послѣ родовъ часто приключается такъ, что иногда она случайнымъ образомъ опъ естественнаго своего мѣста пронувшись и внизъ опустившись, рыльцемъ своимъ виситъ споль низко, что не шокмо перспами оную осязати, но и очами явственно можно видѣть въ самомъ началѣ рукава матки, или передъ дѣтородными часпми внѣ совѣмъ высунувшуюся. Первое несовершеннымъ, а послѣднее совершеннымъ выпадеиъ матки называется. Зри рис. 33 I.

46. Причины выпадеиъ матки сѣи: 1) многомикрошное сложеніе шѣла: 2) порча крови и соковъ: 3) ударъ, паденіе, тяжелая работа, приподниманіе и ношеніе на раменахъ тяжелыхъ шѣлъ: 4) сильное чрева давленіе: 5) часпые запоры въ животѣ: 6) весьма обширный пазъ 7) тяжелые и шрудные роды; сѣи причины сущъ шолько отдаленныя: но самая ближайшая естъ 8) разслабленіе связокъ матки, опъ объявленныхъ причинъ происходящее.

47. Знакъ, о выпаденіи машки удосповѣряющій, есть сей: устье рыльца машки, либо при самомъ началѣ рукава машки, либо внѣ дѣпородныхъ частей, какъ перстами осязаемое, такъ и очами зримое.

48. Припадки, съ выпаденіемъ машки сопряженные, не столько опасны, сколько безпокойны бывающъ, и суть сіи: боль во всей спинѣ и поясицѣ ощущаемая: бѣль долговременно продолжающаяся: прудное мочи испражненіе: запоръ въ животѣ: невозможность совокупленію препятствующая: язвы оспроною истекающихъ мокротъ на выпавшей части причиняемая: вожженіе и гниль на ней же заключающіяся.

49. Возрастъ и лѣта, въ кои выпаденіе машки случисься можетъ, не опредѣляются. Дѣвицы, вдовы, беременныя и роженицы одному суть подверженны. Однакожъ совершенное машки выпаденіе рѣдко у дѣвицъ, чаще у женъ особливо пожилыхъ, кои многихъ дѣтей имѣли, случается.

50. Лѣкарская помощь здѣсь есть крайне нужною, и состоитъ въ томъ, чѣмъ немедленно послѣ родовъ машку выпавшую, рукою вправивъ на свое мѣсто, удержавъ и укрѣпивъ оную въ естественномъ ея положеніи,

ніи, посредствомъ особливаго кольца, изъ твердой и полстой бумаги или пробочнаго дерева заѣланнаго, шнѣмкою оберченнаго, и нѣсколько разъ въ разтопленной воскѣ обмооченнаго: коего видъ можетъ быть круглымъ, овальнымъ, продолговатымъ, треугольнымъ, четверугольнымъ и проч. Зри рис. 33. III. VII.

51. Предвѣспорожности, прежде вправленія выпавшей матки, имѣть нужно сїи: 1) выпавшая матка, или часть ея, иногда бываетъ покрыта нѣкоторою нечистою, влажною какъ коркою: кою надлежащимъ образомъ сперва размягчить, прочь опиять, попомъ и матку очистивъ вправить; 2) при выпаденіи матки, когда роженица есть многокровна, когда кровоочищеніе у неѣ прекратилось, когда бїеніе боевыхъ жилъ есть полное и скорое: то сперва пустить ей кровь; 3) когда роженица еще сверхъ того испражделъ запоромъ мочи, и не имѣетъ испражненія низомъ: то немедленно выпустить мочу мочевымъ выпускникомъ, а испражненію пособлять смягчительными промывательными; и напоследокъ такимъ образомъ прѣугововивъ роженицу, приступить и къ самому дѣлу.

52. Способъ вправлять выпавшую матку есть сей: 1) сперва положить роженицу на

спину такъ, чшобъ головою она лежала нѣ-
 сколько пониже, а ягодицами выше прочаго
 шѣла: потомъ 2) раздвинувъ бедра одно
 ошъ другаго, смазать мапки выпащую часпъ
 деревяннымъ масломъ: послѣ чего 3) двоими
 или тремя перстами слегка въ верхъ при-
 поднимать оную, начиная съ ошъ самой шой
 чѣсти, которая къ заднему проходу еспъ
 оборочена, и такъ далѣе, среднюю и верхнюю
 сяжъ часпъ вправлять въ рукавъ мапки:
 и симъ образомъ перемѣнить совершенное вы-
 паденіе мапки въ несовершенное; по исправле-
 нн сего 4) всеми пяпью ручными перстами
 обложивъ нижнюю ея окружность поднять,
 сколь можно, выше къ верхнему тазу; на-
 послѣдокъ 5) вышеупомянутымъ (50) коль-
 цемъ въ масло обмоченнымъ, и въ рукавъ мап-
 ки запущеннымъ такъ, чшобъ единъ онаго
 край лоннымъ кошпямъ, другій жолобовати-
 вѣ крещца, а боковые край луннымъ ко-
 шпямъ соотвѣтспвовали, самое же рыльце
 висѣло бы въ самомъ отперстнн онаго кольца:
 утвердивъ мапку во своемъ положенн. Такое
 кольцо, порядочнымъ образомъ будучи въ ру-
 кавъ мапки вложено, не можетъ причинять
 ни безпокобствн, ни боли: роженица можетъ
 свободно похаживать, испускать мочу, испраж-
 нять-

нясья низомъ : оно не мѣшается ни мѣсячному кровотеченію , ни плошскому совокупленію. 6) когда такое кольцо причиняетъ роженію ка- коеніесть безпокойствіе , то сіе означаетъ , что оно есть великовзрое : слѣдственно на мѣсто великаго кольца другое поменьше из- брать : напрошивъ того буде отъ малѣйшаго плѣдвиженія , кольцо вложенное обратно вонъ выпадаетъ , въ такомъ случаѣ другое по- больше на мѣсто онаго переменить должно. 7) наконецъ поелику воскъ , коимъ кольцо обык- новенно покрывается , отъ внутренней теплоты мало по малу распаявши , нечувствитель- но съ мокрошами вонъ исходитъ ; въ разсужде- нии сего чрезъ нѣсколько недѣль новое кольцо въ рукавъ мапки вкладывать нужно. Въ про- чемъ 8) роженца , по вправленіи мапки , по- винна чрезъ нѣсколько времени лежать спокойно и неподвижно въ постелѣ : всячески беречися отъ такой пищи и пия , и отъ всего того , что раждаетъ выпры , и напыщаетъ животъ : па- кожь и отъ того , отъ чего кашель , чиханье и рвога приключится могутъ ; испражненію низомъ пособлять ча то наставляемыми промывательными ; воздерживаться отъ тя- желой работы , скорой ходьбы , а особливо не работать ногою на прядильной машинѣ.

Когдажъ случится, что выпадшая матка во своемъ положеніи посредствомъ таковаго кольца удержана быть неможетъ, либо по-тому, что выпаденіе матки есть весьма злѣшное и долгоевременное: либо для того, что маткѣ имѣетъ худое строеніе; въ такомъ случаѣ сверхъ кольца еще и повязки чревные, роженицамъ приличныя, способствовать могутъ.

II. Выпаденіе рукава матки.

53 Выпаденіе рукава матки бываетъ тогда, когда которая нѣсть верхняя, нижняя, боковыя, либо всѣ сіи онаго рукава части совокупно низпадають, и висятъ внизъ такъ, что либо только перстами между дѣтородныхъ губъ ощупываются, либо самымъ дѣломъ видѣ оныхъ виситъ такъ, что и очами видѣть ихъ можно. Первое несовершеннымъ, а послѣднее совершеннымъ выпаденіемъ рукава называется.

54 Причиною выпаденія рукава матки есть расслабленіе внутренней морщиноватой оболочки онаго, отъ неумѣреннаго совокупленія, отъ долгоевременнаго теченія бѣли, и отъ трудныхъ родовъ приключающееся. Иногда съ выпавшею маткою вмѣстѣ и ея рукавъ выпадаетъ.

падаетъ. Рѣдко во время выпаденія рукава машинки, и сама машинка низпадаетъ.

55. Безпокойствіе, выпаденіемъ рукава машинки, особливо совершеннымъ, причиняемое состояніемъ въ томъ, что жена, сему припадку подверженная, не можетъ свободно мочиться, ни совокупляться. В прочемъ оба виды сего выпаденія (53) только безпокойными, но опасными быть немогутъ.

56. Врачебная помощь въ семъ случаѣ есть таже, что и при выпаденіи машинки: т. е. надлежитъ, сколь можно, скорѣе и проворнѣе вправить выпавшій рукавъ машинки въ надлежащее его мѣсто; а по вправленіи удерживать его во своемъ положеніи таковымижъ кольцами (50); а при томъ укрѣпленію онаго способствовать вяжущими и крѣпительными промывательными, насосомъ шуда впрыскиваемыми. Когдажъ таковыми кольцами нельзя будетъ удерживать выпавшаго рукава: въ таковомъ случаѣ на ночь шуда вкладываютъ полотенце шарикомъ или кеглемъ свернутое и вяжущею влагою смоченное. И сіе повторають, пока рукавъ машинки укрѣпится. При чемъ весьма нуженъ покой и воздержаніе отъ любопытствій.

III. Выворотъ матки.

57. Выворотъ матки есть такой припадокъ, когда матка внутреннюю своего дна поверхностью низпадши внизъ виситъ шквѣ, чѣю свое дно иногда въ самомъ рыльцѣ, иногда пониже оного, иногда при входѣ въ рукавъ матки, а иногда въ дѣшородныхъ часшей находишся. Въ такомъ случаѣ внутренняя матки поверхность дѣлается внѣшнею, а внѣшняя внутреннею. Слѣдственно выворотъ матки можетъ быть совершеннымъ и несовершеннымъ. О первомъ только персппнымъ осязаніемъ, а о второмъ и самыми очами нетрудно удостовѣриться можно. Зри рис. 33. II.

58. Время, въ кое выворотъ матки случается, по большей части есть то самое, когда роженицы разрѣшаются отъ своего бремени дѣшорожденія: ш. с. когда рыльце матки долго послѣ родовъ не сожимается, и зѣвающимъ пребываетъ. Однакожъ сіе и въ другіе времена съ женскимъ поломъ приключиться можетъ.

59. Причины выворота матки могутъ быть сіи: 1) разслабленіе мясиспыхъ волоконъ изъ коихъ существо матки состоитъ. 2) употребленіе сожмательной силы, маткѣ
срѣд-

сродной. 3) весьма сильное и непрерывное дѣйствіе родовой боли, при родахъ и послѣ родовъ продолжающейся. 4) скоропостижное и неосторожное извлеченіе или вынятіе дѣтскаго мѣла изъ матки, бабкою или акушеромъ учиненное. 5) сдавливаніе живота неумѣренное. Отъ всѣхъ шаковыхъ причинъ, при томъ по собственной своей тяжести, отъ небережнаго руки прищаженья, или отъ чрезмѣрнаго дѣйствія реймовъ, для матки внизъ съ дѣтскимъ мѣстомъ, либо и безъ онаго, опустившись, чрезъ опверстное рыльце матки выпадаетъ, и тако мало по малу вся матка даже и самое ея рыльце выворачиваются.

60. Знаки, о совершенномъ или несовершенномъ выворотѣ матки удостовѣряющіе, суть сїи: вывороченная матка представляетъ округлое, мягкое, ноздреватое, морщиноватое тѣло, которое бываетъ покрыто бѣлою клейкою слизью, индѣ черноватыми пятами, индѣ кровію обогренное, а индѣ много крови испочающее. Такой выворотъ не только перстами свободно осязатъ, но и очами явственнo видѣть можно.

61. Припадки съ выворотомъ матки сопряженные, суть сїи: жестокое кровошеченіе: стягость чрезмѣрная: несносная боль, давленіемъ чув-

чувственныхъ жилъ причиняемая: бѣненіе бое-
выхъ жилъ скорое, и твердое: возженіе ма-
шки, вскорѣ распростирающееся такъ, что
скоростижно въ Антоновъ огонь прѣмѣняе-
ся: корча и судорога: омраки: потеряніе
чувствъ: кои на послѣдокъ вскорѣ прекраща-
ются неизбѣжною смертію.

62. Врачебная помощь тѣмъ есть нужная,
чѣмъ окончаніе сего бѣдственнаго припад-
ка бываетъ сопровождаемо столь опасными слѣд-
ствіями. Чего ради надлежитъ, сколько можно,
скорее вправить вывороченную машку на свое
мѣсто. Способъ въ томъ поступать есть сей:
1) исполнивъ все выше (51) упомянутое: 2)
положивъ роженицу вышепоказаннымъ (52)
образомъ: 3) вправить вывороченную машку,
равно какъ и выпадшую, сперва въ рукавъ ма-
шки: и тако изъ совершеннаго выворота
сдѣлать несовершенной; 4) приподнять пер-
стами вывороченное дно машки, сколько мож-
но, выше внутрь паза: 5) одною рукою
поддерживать снаружи нижнюю чрева часпъ
у роженицы: а другою, внутрь машки вло-
женною, поправлять оную такъ, дабы какъ
дно машки, такъ и ея рыльце получили есте-
ственное свое положеніе: 6) тоюжъ рукою
распростиерною выровнять и уладить мор-
щино-

щиповатые згибы на поверхности матки находящіяся: 7) держаще оную руку во впадинѣ матки столь долго, поворачивая ея слегка, пока матка оную чувствительно сожимать начнетъ: тогда 8) ручные персты на подобіе кегля сложивъ, слегка двигая вынимать изъ матки: 9) держаще окончанія перстцевъ въ самомъ ея рыльцѣ столь долго, пока оное вокругъ перстцевъ явственно сожиматься начнетъ: 10) иногда не бесполезно, для поддержанія матки, носить кольцо вышепоказанное. Когда матка исправно бываетъ вправлена въ надлежащее свое положеніе, тогда ощупительно слышится шумъ, или пуканье, подобное тому, кое въ случаѣ грыжи, въ то время, какъ выпавшія кишки вправляются на свое мѣсто, чувствуется.

63. Предосторожности нужныя, передъ вправленіемъ вывороченной матки, когда выворотъ давно случился, или вожденіе въ ней воспослѣдовало, суть сїи: сперва очистишь и размягчишь вывороченную матку смягчительными тепловатыми припарками:пустишь кровь изъ руки, а въ случаѣ нужды и повторишь проволупканіе: по томъ деревянымъ масломъ смазавъ всю вывороченную матки часть, вправишь оную на еѣ мѣсто:
при

при чемъ внутренно болящей давати разводящія и прохлаждающія лѣкарства.

64. Предвосторожности, по вправленіи мапки вывороченной, роженицѣ имѣть должно слѣдующія: 1) спокойно опочивать въ постѣли, и лежать на спинѣ чрезъ цѣлые сутки такъ, чтобъ ягодицы были приподняты выше прочихъ частей: 2) опинудѣ не надуваться при испусканіи мочи и во время испражненія низомъ: 3) пищу употреблять такую, которая скоро въ желудкѣ варится и не много питаетъ: 4) ежедневному испражненію пособлять смягчительными промывательными: 5) питье употреблять разводящее и прохлаждающее: 6) воздерживаться отъ всего того, что горячитъ, и приводитъ кровь въ волнованіе, т. е. отъ преного кушанья, горячихъ напитковъ и любоспастія: 7) совершенно освободившись отъ припадковъ, роженицамъ свойственныхъ, внутренно пользоваться ослицинымъ или козьимъ млекомъ. Все сіе наблюдать нужно споль долго, пока у роженицы обыкновенное мѣсячное кровотеченіе въ первой разѣ послѣ родовъ окажется.

IV Выпаденіе кишки.

65. Выпаденіе задней кишки найпаче приключается такимъ роженицамъ, кои рождають дѣтей стоя, или сидя, и кои во время родовъ, пособляя дѣйствию переймовъ, работаютъ съ превеликою напугу. Слѣдственно

66. Причиною сего припадка естъ во первыхъ, непорядочное роженицы положеніе; а во вторыхъ, жестокіе переймы съ сильною напурою; отъ чего задняя кишка разслабѣвши, послѣ родовъ, либо и при самихъ родахъ, вскорѣ вонъ выпадаетъ.

67. Помощь бабичья, заблаговременно отъ сего припадка роженицъ предохранишь могущая, состоитъ въ томъ, когда бабка уговариваетъ рожавшую, дабы она во время родовой боли, содѣйствовала оной, спокойно возлежа на постелѣ, дабы она не надувалась, и насильно къ тому себя не понуждала; а при томъ еще и тѣмъ, когда тажъ бабка прислуживая роженицѣ, во время переймовъ, рукою поддерживаетъ промежность срамно-проходную, совокупно съ заднимъ проходомъ.

68. Помощь врачебная состоитъ въ томъ, дабы выпавшую послѣ родовъ заднюю кишку, немедленно вправиль на свое мѣсто; а попомъ

Удѣр-

удержашь и укрѣпиль оную во своемъ положеніи посредствомъ вѣжущихъ и крѣпительныхъ лѣкарствъ, вѣ къ самому проходу часто прикладываемыхъ, какъ о томъ въ Ч. III. Гл. II. н.2. подробно показано.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О слѣломъ и открытомъ лоччуѣ. а)

69. Слѣпый почечуй гораздо чаще роженицамъ, чѣмъ открытый случается. Роженицы наиболѣе сему припадку подвержены бывають тѣ, кои и во время своей беремености оной имѣли. Однакожъ слѣпый почечуй у нѣкоторыхъ роженицъ оказывается только послѣ родовъ, хотя онаго передъ тѣмъ у нихъ опияюдъ не бывало.

70. Причины слѣпаго почечуя, роженицамъ обыкновенно заключающаго, суть сіи: многокровоіе: родовое кровоочищеніе скоропостижно прекратившееся: запоръ живота; многотрудные и продолжительные роды: испражненіе низомъ не частое, и съ великою напругою бывающее.

71.

а) Зри Иск. повив. Ч. III. Гл. VII.

71. Врачебныя средства, къ отвращенію, или по меньшей мѣрѣ, къ облегченію сльпаго почечуя, роженицамъ приключающагося, сунѣ тѣже, кои и беременнымъ, симъ припадкомъ спраждущимъ, во своемъ мѣстѣ показаны. Когда боль отъ того происходящая, есть жестокая; въ такомъ случаѣ, особливо по окончаніи родового кровоочищенія, приносѣтъ великую пользу тепловатыя пары, купѣль, ванна, смягчительныя промывательныя, припарки, мази, и кровопусканіе, приложенными къ почечуйнымъ шишкамъ пиявицами, произведенное. При открытомъ почечуѣ, когда онъ случится, тожъ наблюдается, равно у роженицъ, какъ и у беременныхъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

о простомъ поносѣ.

72. Простый поносъ, или мыѣ, у роженицъ приключается при самыхъ родахъ, и послѣ родовъ. а)

ЧАСТЬ IV.

Д

73.

73. Причины мыша суть сіи: обремененіе желудка пищею: прежде бывшее и пыщеніе живота: простуда: невоздержность и нерадѣніе о своемъ поведеніи: и сильныя душевныя возмущенія, а наипаче гнѣвъ и страхъ.

74. Врачеваніе сего припадка ш мѣ болѣе поспѣшествуется, чѣмъ скорѣе бывающъ отъ вращены причины онаго. Напримѣръ: когда мышъ у роженицы случился отъ обремененія желудка: въ такомъ случаѣ пользуютъ разводящія, легкія слабительныя, и напоследокъ крѣпительныя лѣкарства. Когда причиною онаго естъ простуда; тогда потовыя, и испарину производящія, также покой и теплая постель суть нужными. Когдажъ мышъ приключился отъ возмущеній душевныхъ: когда при томъ настопшая лихорадка у роженицы примѣчается, съ ощущаемою въ ея чревѣ болью и колющемъ въ такомъ случаѣ кровоусканіе, смягчительныя промывательныя и усыпительныя лѣкарства приносятъ роженицамъ великую пользу.

75. Опасность, отъ случившагося роженицъ понесѣ, ш мѣ естъ больше, чѣмъ долѣ оный продолжается. Когдажъ еще при томъ родовое кровоочищеніе внезапно прекратилось: когда чрево у роженицы весьма распухнетъ и

затвердѣтъ, съ оцущаемою въ немъ жестокою и непрерывною болью: и когда горячка съ брѣдомъ въ ней окажется, и все то больше трехъ сутокъ безъ послабленія продолжается; то сіе предзнаменуетъ скорую и неизбѣжную ея кончину.

ГЛАВА ПЕРВАЯ НА ДЕСЯТЬ.

О безпрерывномъ теченіи и зловѣ мочи.

1. Безпрерывное теченіе мочи.

76. Безпрерывное теченіе мочи часто у роженницъ послѣ родовъ случается, и бывашъ пропиву ихъ воли и желанія.

77. Причины безпрерывнаго теченія мочи суть сіи: разслабленіе мочевого пузыря, дѣтскою головкою долговременно надъ нею передъ родами спявшею, причиненное разрывъ шоговъ пузыря, клѣщами при вынятій большой дѣтской головки упоупребляемыми, или не осторожными бобичьими поворосами причиненный.

78. Знаки сего припадка явственны самы собою открывающіяся, и суть сіи: моча каплями вонъ вытекаетъ безпрестанно, безъ удер-

жанія, безъ всякаго роженицы побужденія и желанія: вожженіе и язвы на виѣснихъ дѣтородныхъ частяхъ рождаются: жестокая и неносная боль роженицею тамо ощущается: печеніе мочи чрезъ рукавъ мапки, когда въ немъ разрывъ воспослѣдовалъ.

79. Способъ, въ томъ еще болѣе о разрывѣ мочевого пузыря удостовериться ошмомъ, есть прожій, а именно: посредствомъ мочевого выпускника: впрыскиваемой въ мочевой пузырь влагою, помощію лѣкарскаго насоса: и перспнымъ испытаніемъ. Когда мочевый выпускникъ, бываетъ заведенъ чрезъ мочеиспускательной стволъ, внутрь мочевого пузыря, то конецъ оного посредствомъ перста въ рукавъ мапки вложеннаго, одупывается; а насосомъ впрыскиваемая влага въ мочевой пузырь, вонъ испускаетъ опшуда чрезъ рукавъ мапки, а изъ него иногда и пѣсчинки или извѣстные сроспки вонъ исходятъ.

80. Врачеваніе сего припадка шѣмъ есть нужное, чѣмъ печеніе мочи непрерывное бываетъ опасно; ибо роженица, сверхъ дурного запаха, еѣ окружающаго, находится въ безпрестанномъ безпокойствіи, ошѣ боли, испекающею оспрою и ѣдкою мочео, ей причиняемой. Если неудержаніе мочи происходитъ
ошѣ

отъ разслабленія мочевого пузыря и мочеиспускательного ствола: по хощя се само собою современемъ прекращается, и проходитъ въ благополучно; одни кождъ не бесполезно шому пособлеть и крѣпительными лѣкарствами, какъ внѣшними, такъ и внутренними. Еслижъ безпрерывнаго теченія мочи пришиною естъ разрывъ мочевого пузыря и рукава мѣшки; въ такомъ случаѣ хощя нѣкоторые и совѣтуютъ предпринять шивку; но какъ оную въ дѣйство произвести шрудно, да и польза отшуда обѣщанная основивается только на однихъ догадкахъ, и никакими достоверными опытами еще и понынѣ не подтверждена; въ разсужденіи сего лучшее и безопаснѣе къ облегченію сего припадка средство состоитъ въ ношеніи повязокъ, на рис. 32. IV. и V. изображенныхъ; предоставляя прочее разрушеніе цѣльнаго единой природы цѣлительному содѣйствію и уврачеванію.

II. Запоръ мочи.

81. Запоръ мочи, равно какъ и неудержаніе оной, не рѣдко у роженицъ случается послѣ родовъ. Сей припадокъ бываетъ шчаль сильный, что хощя роженицы, и чувствуютъ великое въ себѣ внутреннее побужденіе ма-

чипься: однакожь моча опниюдѣ неизходитъ, либо хопя и испекаетъ, но только каплями, съ превеликою трудностію, и то временно.

82. Причины запора мочи могутъ быти сѣи: 1) воспаленіе мочевого пузыря и мочеиспускательнаго ствола, отъ весьма великой, или косвенно въ родахъ лежавшей дѣтской головки, долговременнымъ ея давленіемъ причиненное: и 2) выпаденіе матки (45).

83. Знаки, о запорѣ мочи неложно свидѣтельствующіе, суть сѣи: не обыкновенное продолженіе времени послѣ того, какъ роженица мочилась въ послѣдній разѣ: возвышеніе и твердость нижней чрева части, отъ пупка до лона явственно проспирающіяся: жестокая боль тамо ощущаемая: и частое, но весьма болѣзненное, къ испусканію мочи побужденіе, однако почти безъ всякаго дѣйствія.

84. Врачеваніе сего припадка поспѣшествуется добрымъ и благоуспѣшнымъ отвращеніемъ причинъ онаго. Напримѣръ: когда запорѣ мочи у роженицы воспослѣдова въ отъ первой причины: въ такомъ случаѣ кровопусканіе, смягчительныя припрки, промывательныя, тепловатыя пары, разводящія и прохлаждающія лѣкарства, много пользуясь; причемъ, буде моча не из-

о запорѣ мочи и грудныхъ припадкахъ. 71

ходить, то нужно выпускать оную мочевымъ выпускникомъ (рис. 30. VI.); и слегка тереть болящую часть. Когда же запоръ мочи случится отъ выпаденія матки: той оный скорѣ опирающагося искуснымъ вправленіемъ матки въ натуральное ея положеніе (52.).

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЬ.

О грудныхъ болѣзненныхъ припадкахъ.

85. Грудные болѣзненные припадки, коими часто роженицы послѣ родовъ страдаютъ, могутъ быть разделены на двѣ species. А именно: они приключаются либо на самыхъ грудныхъ сосочкахъ, либо въ самомъ существѣ сосцовъ: и бываютъ общими какъ беременнымъ, такъ и роженицамъ. О припадкахъ, кои на сосочкахъ и сосцахъ случаются, такъ же и о вращеніи оныхъ, подробно въ Ч. III. Гл. XII. показано. Здѣсь описывается въ краткѣ описанъ особо роженицамъ свойственный грудной болѣзнь, кои суть слѣдующія: весьма великое изобиліе млека, въ сосцахъ отъ льющагося: великій во млекѣ недостатокъ: напряженіе, зрѣлость, вожжение и нарывы въ сосцахъ оказывающіяся.

I. Чрезмѣрное млека изобиліе.

86. И которыя роженицы, вскорѣ по разрѣшеніи отъ бремени начинающія собственною грудью кормить новорожденныхъ дѣтей своихъ, получающъ столь сильное умноженіе млека во своихъ сосцахъ, что отъ чрезмѣрнаго изобилія онаго оба сосцы значительно напряжены будучи, почти одинъ другаго касающіяся однакожъ не твердѣютъ и не краснѣютъ.

87. Причины такого изобилія млека могутъ быть сіи: когда мать, получая изобильную пищу, не часто даетъ сосать грудь своему пипомцу: и когда она есть сложенія многокровнаго, и веселаго нрава.

88. Припадки, отъ изобилія млека причиняемые, суть сіи: чувствительное сосцовъ растяженіе: боль въ сосцахъ, отъ давленія чувствительныхъ жилъ, преисполненными млеконосными протоками принимаемая: и безпрерывное изъ сосцовъ теченіе млека, роженицѣ не малое безпокойствіе причиняющее.

89. Врачебный совѣтъ, исполненіемъ коего умноженіе изобилія млека отвращается, состоитъ въ слѣдующемъ: чаще давать сосать грудь младенцу, какъ скоро онъ воплемъ своимъ о томъ дастъ возчувствовать: ни ка-

кою другою пищею онаго не кормить, дабы дитя могло совершенно высасывать опдѣлившееся въ грудяхъ млеко: другое дитя прикладывая къ грудямъ для сосанія, когда собственное не въ силахъ находится все млеко опоражнивать: роженицѣ по меньше пищательной пищи употреблять: а въ случаѣ многокровія, кровь пускать, и дѣлодвиженіе имѣть.

II. Недостатокъ млека.

90. Не многія роженицы имѣютъ недостатокъ во млекѣ. Обыкновенно столько млека въ сосцахъ каждой роженицы обрѣщается, что оно дозволяетъ къ насыщенію новорожденного младенца, коему не столько нужно количество и изобиліе: но доброе качество онаго. Въ прочемъ весьма рѣдко совершенный во млекѣ недостатокъ случается въ первыя шесть недѣль послѣ родовъ.

91. Причины, отъ коихъ недостатокъ во млекѣ рождается, могутъ быть сіи: шлодвиженіе и истощеніе силъ: худая и нездоровая пища: и сухое шлоа сложеніе.

92. Средства, недостатокъ млека отвращающіе, и лучшему онаго опдѣленію способствующія, суть сіи: роженицѣ употреблять пищу хлѣбную, молочную, питательную:

иногда питаются огородными овощами, зелѣями и плодами, а иногда и животноымъ питаніемъ не жирнымъ, свѣжимъ и легко сваривающимся: воздерживаться отъ пици прѣной и отъ разгорячительныхъ напѣшковъ: пить доброе старое пиво, полпиво, и ячменной взварь, или подѣ No. 36. предписанной: имѣть умѣренное плѣдвиженіе на открытомъ воздухѣ, и добродѣтельное во всемъ благоповеденіе: ранне ложиться спать и по ранне вставать: убогаться чрезмѣрной горнишней теплоты: стараться быть веселой: защищать сосцы отъ спужи теплыми покрывами: и давать сосать грудь своему питомцу, какъ скоро онъ того своимъ вѣплемъ возтребуешь.

III. Напряженіе и затвердѣлость сосцовъ.

93. Роженицы, въ сосцахъ коихъ великое изобиліе млека разлаеся (86), наиболее бывающъ подвержены сему припадку, когда онъ заблаговременно его отворачивать не стараются. Груды у нихъ сперва явственно напругаются, потомъ вскорѣ крѣпнушъ, затвердѣвающъ, и причиняющъ немалую боль: однакожъ не краснѣющъ.

94. причины напругенія и затвердѣлости сосцовъ могутъ быть три: когда роженица,

имѣя

имѣя изобиліе млека, сама не хочетъ грудью кормить дитя свое: когда единъ сосецъ даетъ сосать младенцу: когда сосцы проспужены, бывши обнаженными, или непорядочно и недовольно покрытыми: и когда роженицы вскорѣ послѣ родовъ шѣсно себя повязками, или узкими шнуровками, снѣгиваютъ.

95. Помощь врачебная здѣсь есть крайне нужною, и состоипѣ въ томъ, чтобъ немедленно таковое напряженіе и зашвердѣлость въ сосцахъ случившіеся разбить и разогнать приведеніемъ остановившагося млека во движеніе. Сіе исполняется посредствомъ смѣшанныхъ, разбивающихъ и разводящихъ лѣкарствъ, внѣ и внутрь употребляемыхъ: частымъ высасываніемъ млека изъ напряженнаго сосца губками младенца, или устами взрослого человека, рожками и банками. Иногда случается, что не взирая на всѣ употребленные средства и предосторожности, таковыя зашвердѣлость возженіемъ пораженна бываетъ.

IV. Возженіе и нарывъ въ сосцахъ.

96. Возженіе въ сосцахъ неизбежно приключается, наипаче у такихъ роженицъ, кои суть подвержены вышеобъясненнымъ (86. 93.)
при-

припадкамъ. ш. е. у коихъ изобиліе млека, напряженіе и зашвердѣлость сосцовъ не только не уменьшается, но отъ часа на часъ еще больше усиливается и умножается.

97. Причины вожжеія въ сосцахъ могуть быти сіи: скоропоспигное родового кровоотщепленія прекращеніе: нердніе о воздоеніи и вскармленіи младенца грудью: мало въ сосцахъ остановившееся и сворожившееся, когда дитя онаго сосать не можетъ, или отъ сосанія отвыкнѣвъ: порча въ грудныхъ сосочкахъ, или когда въ нихъ нѣтъ никакого опверенія, и когда дитя своими губками оныхъ захватывать не въ силахъ: досада, пришибъ, или ударъ сосцамъ причиненные: простуда: сильныя душевныя возмущенія, а особливо гнѣвъ, страхъ, переполохъ, ш. е. когда внезапно роженица разсердится или испугается: напосадокъ пластыри, мази, и перегнанное мясное, или другое крѣпкое масло, безвременно къ сосцамъ прикладываемыя.

98. Знаки и припадки, вожженіе въ сосцахъ воспослѣдовавшее, достовѣрно означающіе суть сіи: опухоль въ сосцахъ непрерывно умножающаяся, зашвердѣвающая и рдѣющая: жигучая и несносная боль въ нихъ ощущаемая: ознобъ и жаръ попеременно оказывающіеся:

шется: бѣненіе боевыхъ жилъ скорое, частое, твердое и полное.

99. Врачебныя средства, дальшему распространѣнію вожженія сопротивляющіяся, суть сіи: кровопусканіе изъ ноги, когда родовое кровоочищеніе уже прекратилось: слабительныя и промывательныя лѣкарства чаще употребляемыя: пища шонкая и легкая: тепловатыя припарки и пластыри разгоняющія, къ сосцамъ прикладываемыя, подъ No. 29. 37. означенныя: и частіе выщѣживаніе млекъ. Ноготыя и сахаромъ накуреныя салфетки, суконки, или хлопчатая бумага, ко грудямъ часто прикладываемыя: спокойствіе тела и духа: и удавленіе отъ всѣхъ домашнихъ заботъ и упражненій, а особливо нисего неработать руками, и если можно, опіюды оными не шевелить и не двигать. Все сіе пользуется, когда вожженіе только по поверхности сосцовъ, но еще не глубоко въ самомъ ихъ существѣ распространилось, и когда лихорадка есть едва примѣтная; напротивъ того, когда вожженіе, и далеко въ окружности, и глубоко внутри примѣчается: когда оное отъ вычисленныхъ средствъ не умалается: когда опухоль, боль и лихорадка отъ часа на часъ усиливаются и возрастаютъ:

юшѣ: когда вожженная часть цвѣтшомъ перемѣняется, и дѣлается темно-красною: когда напослѣдокъ опухоль становится мягкая, и колебаніе жидкости въ ней одушается; по все сіе означашъ то, что вожженіе перемѣняется, или уже перемѣнилось въ настоящее: коему всячески пособлѣть нужно смягчительными тепловатыми припарками и пластырями. А какъ скоро нарывъ созрѣетъ, и гной въ немъ окажется; то немедленно по мѣсто, гдѣ колебаніе гноя примѣчается, ланцетомъ бережно разрѣзать, рану отъ гноя порядочно очистить, и по правиламъ искусства оную исцѣлить надлежитъ.

ГЛАВА ТРЕТИЯНАДЕСЯТЬ.

О сылѣ и лихорадкѣ съ пятнами.

I. Млечная сыль.

100. Млечная сыль и пятна у роженицъ послѣ родовъ приключаются, хотя и не означаютъ почти никакой для нихъ опасности: однакожъ не должно оставлять ихъ въ пренебреженіи.

101. Причиною такой сыпи часто бываетъ то, когда роженица не кормитъ грудью новорожденное дитя: когда она простудилась: когда кровотечение внезапно прекратилось, и прочая.

102. Виды такой млечной сыпи бываютъ прякіе: первая сыпь обыкновенно случается послѣ млечной лихорадки, и продолжается отъ 8 до 10 дней: пяпина бываютъ малыя, остроконечныя, бѣлыя, и мушкетерныя: они причиняютъ зудъ, свербежъ, нѣкогда рую боль и колюще въ самой кожи ощущаемыя. Вторая сыпь оказывается пяпинами, или пупырышками побольше перъзыхъ: они видомъ своимъ являющіяся бытъ весьма подобными воспаленнымъ: иногда продолжаются доліе перъзыхъ: и не столь чувствительной зудъ причиняютъ. Третья сыпь начинается являться пяпинами, или бляшками неограниченнаго начертанія, нѣсколько выше кожи возвышающимися: при началѣ ихъ явленія, ощущаются жаръ, зудъ, и легкое вожженіе: они производящіяся на разныхъ частяхъ тѣла: иногда они гораздо доліе продолжаются, чѣмъ оба первые виды оныхъ.

103. Врачеваніе такой сыпи состоитъ въ томъ, чшобъ роженицу наблюдать си предъ-
осмо-

оспорожности: пребывать въ шепломъ мѣстѣ: стараться, чтобъ было порядочное испареніе: часто пить взваръ, подъ №. 38. означенной: испражненію низомъ пособлять смягчительными промывательными, часто наставляемыми: довольствоваться похлебками тонкими и пищательными, съ довольнымъ количествомъ поренныхъ зелѣй прѣуготовленными: по прекращеніи кровоочищенія принимать легкія слабительныя: и часто, тереть, особливо послѣднюю сыпь, мазью, изъ деревянаго масла и воска состоящую.

II О лихорадкѣ съ пятнами.

104. Лихорадка съ пятнами роженицамъ послѣ родовъ отъ 2 до 8 дней приключается. Она начинается оказываясь малыми пятнами, или пупырышками желтоватыми, пшени подобными, выше кожи возвышающимися. Въ самомъ средоточіи сихъ пятенъ оказываются власно какъ сосочки, или стержень, наполненные сукровицею водяною, и прозрачною. Такая пятна иногда являются только на груди, на выи, и между перснями: а иногда они покрываютъ все тѣло. Сія лихорадка есть не опасна, когда роженица добropорядочно во всемъ себя ведетъ и хранитъ данные ей добрые совѣты и наставленія.

105. Причины сея болѣзни могутъ быть пѣже, отъ коихъ и сыпъ случается (101). но припадки съ нею сопряженные бывають гораздо сильнѣе, и суть сїи: въ началѣ ея приступа все шѣло у роженицы болитъ: жаръ и ознобъ попеременно оказываются: руки, особливо ладони горящъ и рѣбютъ: бѣненіе боевыхъ жилъ есть скорое, частое, и слабое: грудь спѣсняется: безсонница раждается: главоболѣніе, шумъ и звонъ въ ушахъ, и спѣсненіе въ грудяхъ, попеременно мучатъ: бѣненіе боевыхъ жилъ переменяется, и дѣлается неравномерное: кровоочищеніе внезапно прекращается, и поносъ иногда открывається. Бѣдъ случающихся, не столько есть опасенъ. Когда при всѣхъ сихъ припадкахъ родовое кровоочищеніе порядочно и непрерывно продолжается, то родящая благополучно отъ сея болѣзни освобождается.

106. Врачеваніе сея немочи требуетъ особеннаго вниманія. Кровоопусканіе здѣсь едва можетъ имѣть мѣсто, развѣ особенное врачебное показаніе, и состояніе болящей того требуютъ. Благоумѣренная діета, пипаніе тонкое, легкое, пипаніе: сыворопка или взваръ подъ No. 38. въ пищѣ ежедневное, и порошокъ подъ No. 39. предписанный

ЧАСТЬ IV.

Б

чрезъ

чрезъ три часа употребляемый: также промывательныя смягчительныя : приносятъ спорадическую великую пользу. Въ прочемъ когда великая тяжесть въ головѣ, звонъ въ ушахъ и сильная одышка болящую много беспокоятъ: когда приномъ и кровоочищенію опіюмъ нѣтъ; въ такомъ случаѣ не бесполезно приложить ей къ ножнымъ икрамъ нарывной пластырь, и внутренно принимать по упрямъ лѣкарство слабительное подъ №. 40; а къ ночи наставлятъ промывательное подъ №. 1. предписанныя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О млечныхъ нарывахъ, или олухолахъ.

107. Млечныя опухоли, или нарывы, уроженіи иногда гораздо послѣ родовъ, на разныхъ частяхъ тѣла случаются. Счастлива та роженица, у которой такая опухоль снаружи а не внутри содѣлается. Однакожъ гдѣ бы она не приключилась, врачеваніе опіюмъ оплагоемо быть не должно.

108. Причины такой млечной опухоли быть могутъ прежде (101) вычисленныя. Обыкновенно

венно сїи опухоли приключаются отъ того, когда роженица, не взявъ надлежащихъ предъосторожностей, вскорѣ перестаетъ кормить дитя свое; отъ чего млеко бросается въ разные тѣла части.

109. Знаки въ томъ удостовѣряющіе, суть тѣ самыя опухоли, на которомъ нѣсть членѣ возвышающіеся, и съ явственною болью и бѣненіемъ въ нихъ ощущаемыми оказывающіеся, чпо и узнать не трудно. Но иногда отнюдѣ нѣтъ ни какой наружной опухоли: однакожъ мокроты внутри сокращаются. При чемъ припадки бываютъ сїи: скорое, полное, и дрожащее боевыхъ жилъ бѣненіе; сухая кожа по всему тѣлу, безъ жара; животъ мягкій, безъ боли: моча и испражненія суть естественными; но вскорѣ по томъ оказываются жесточайшіе припадки: а именно, бредъ, ознобъ, или чувствіе холода, особливо не частяхъ волосами покрытыхъ; боязнь смерти: болящей спящей или бдящей, является призракъ, мечта или привидѣніе: очи мгновенно на единъ предметъ вперяются, свѣщающіеся и дикіе: у нѣкоторыхъ внезапное ощущается главоболѣніе, и въ то самое время имъ кажется, будтобы имъ учиненъ былъ жестокій ударъ въ голову; тогда за симъ звонъ въ ушахъ, усыпленіе, храпленіе, неумѣренный

смѣху и хохотанье, судорожныя движенія, и прочая немедленно оказывающіяся. У нѣкоторыхъ женъ предварительными припадками бывающъ только снѣ: провищательный, твердый, скорый и отпривчившій голосъ, и брѣдъ вскорѣ по шомъ слѣдующая. Въ семъ послѣднемъ случаѣ роженица въ 4 или 5 день получаетъ оныя припадки; т. е. когда маско въ еѣ сосцахъ не опдѣляется, и когда окружающіе еѣ думаютъ, что она совершеннымъ покоемъ и здоровьемъ наслаждается.

110. Врачеваніе сего припадка предпріимается симъ образомъ: 1) когда явственная опухоль уже содѣлалась: въ такомъ случаѣ ни кровопусканіе, ни разбивающія лѣкарства не пользуютъ; нужно только пособлять, дабы она опухоль скорѣе созрѣла и возгноилась, посредствомъ смягчительныхъ тепловатыхъ припарокъ, часто къ ней прикладываемыхъ, пока боль утишится, опухоль содѣлается мягка, и колебаніе гноя въ ней окажется; что какъ скоро примѣчено будетъ, то не ожидая, пока нарѣвъ самъ собою прорвется, надлежитъ немедленно вскрыть его ланцетомъ. Въ противномъ случаѣ гной, долго безъ испражнения пребывающій, смѣшавшись съ кровію, можетъ броситься, или перейти ко другой тѣ-

ла часпи; по вскрытїи нарыва, и по испре-
бленїи нечистоты, язва исцѣляется по прави-
ламъ искусства. 2) Когдажъ нѣтъ на тѣлѣ
никакой опухоли, а вычисленные (109) при-
падки, медлѣнно у роженицы оказывающїеся
примѣчающся, что требуетъ особливаго внима-
нїя; въ такомъ случаѣ иногда можно, предвупреж-
дая оныя, отвратить кровопусканїемъ изъ ноги
повтореннымъ, смотря по общо-тѣлѣствамъ:
купелью или ванною, изъ теплой воды состоя-
щею: искусственною минеральною водою,
подъ №. 41. означенною: пишемъ взвару
подъ №. 35. предписаннаго: промывательными
смягчительными: слабительными легкими: упо-
требленїемъ пищи тонкой, легкой, не много
пищательной: и на конецъ сосанїемъ млека изъ
сосцовъ, младенческими ушами, или другимъ
образомъ.

ГЛАВА ПЯТАНАДЕСЯТЬ.

О опухоли нижнихъ удовъ.

III. Опухоль нижнихъ удовъ, ш. е. ногъ,
голеней и ляшекъ, у роженицъ часто приклю-
чается послѣ бывшаго сильнаго кровошеченїя,

отъ скоропоспѣжнаго прекращенія родового кровоочищенія, отъ сыпи, отъ млечной опухоли, и отъ того, когда роженицы вскорѣ перестаютъ кормить грудью дѣтей своихъ.

112. Зѣнки и припадки таковую опухоль ознаменующіе, суть сіи: пятгосѣ въ пазѣ, и поясницѣ, слабость въ удахъ, и боль наипаче въ пахахъ ощущаются: боль сильнѣе спиновится, когда роженица лежитъ пропавуши ноги, а меньше и сноснѣе, когда ноги у неѣ скорѣны: опіокъ медленнѣе оказывается чрезъ расшлѣженіе, боль при иняющее, начинаясь отъ верхнихъ и распространяясь къ нижнимъ частямъ; боль поспешенно уменьшается, чѣмъ больше опіокъ умножается: лихорадка, слабое главоболѣніе, и маленькій кашель случаются, когда опухоль отъ одной ко другой части переходитъ. Иногда опухоль не только уды, но и все шѣло окружаетъ; и иногда ни лихорадка, ни прочіе припадки не являющся.

113. Грачѣбная помощь должна быть различна, взглядомъ причинъ, отъ коихъ таковая опухоль на нижнихъ удахъ рѣждается. Н примѣръ: 1) когда опухоль на ногахъ случилась послѣ жеспокаго кровотеченія: то она вскорѣ благополучно проходитъ, если роженица, пребывая въ совершенномъ покоѣ, употреб-

употребляетъ добрую и здоровую пищу. При чемъ нужно ей парить ноги душистыми травяными припарками, или крѣпительнымъ взваромъ: тереть оныя сухою байкою или суконками, съ малымъ количествомъ двоеной водки; а по ветерамъ принимать усыпительное лѣкарство. Все сѣе разумѣется о такой роженницѣ, у которой родовое кровоочищеніе совершенно прекратилось. 2) Когда опухоли причиною есть прекращеніе кровоочищенія: въ такомъ случаѣ потовыя, испаренію и родовому кровоочищенію способствующія лѣкарства, также смягчительныя тепловатыя припарки, къ распухшимъ членамъ часто прикладываются, пользуются; а какъ скоро прекратившееся кровоочищеніе снова возвратится, и при томъ уды еще остаются распухшими: тогда слабительныя лѣкарства, и пребываніе въ покой довлеютъ. 3) Когда такая опухоль приключается отъ млечной сыпи и опухоли, или отъ захряслости и оспановленія млечка: въ такомъ случаѣ кровопусканіе изъ руки, если бѣненіе боевыхъ жилъ есть полное и твердое: а изъ ноги, если есть боль въ головѣ, въ началѣ пользуется. Но оное не имѣетъ мѣста, когда уже совершенный оттокъ окажется, или когда кровоочищеніе еще продолжается.

ся. Тогда надлежитъ снаружи къ опухолямъ прикладывать тепловатыя смягчительныя припарки, изъ молока, яичнаго желтка и деревянаго масла со цвѣтомъ бѣлыхъ лилій настояннаго, прѣугоповленные: внутренно давать по временамъ легкія слабительныя лѣкарства, а въ питье взваръ подъ №. 2. и 35. предписанныя: питаться похлебками легкими питательными, съ говядиною, шеляпиною, цыпленками, и съ довольномъ количествомъ поваренныхъ зелѣй прѣугоповленными и прочая.

ГЛАВА ШЕСТАЯНАДЕСЯТЬ.

О бѣли.

114. Бѣль приключается не только роженицамъ послѣ родовъ, но и беременнымъ женщинамъ, и самымъ дѣвамъ а). У родильницъ течение бѣли бываетъ либо давнее и застарѣлое, либо обыкновенное; а при томъ въ маломъ, или большемъ количествѣ. Здѣсь только о послѣднемъ кратко объяснить нужно.

151.

а) Зри. Ч. III. Гл. VI

115. Причины, бѣль послѣ родовъ производящія, суть сїи: роды тяжелые, многотрудные или не естественные: кровошеченіе послѣ родовъ жестокое: млеко разлившееся и млечныя опухоли. сложѣе тѣла мокротное и слабое: запоръ или напыщеніе живота, разгорячительныя вещи, въ излишесствѣ употребляемыя: раны въ малкѣ во время родовъ учиненныя.

116. Знаки, коими настоящая бѣль оплывается, суть сїи: она иссекаетъ каплями бѣлыми, цвѣтомъ и густотою сливокъ подобными: на чистой холстинкѣ едва отъ нея осязается пышно почти непримѣнное. она ни боли не причиняетъ, ни раздражаетъ: иногда бываетъ цитроннаго цвѣта, что случается только тогда, когда роженица разгорячится, или отъ волнованія крови. Иногда иссекающая бѣль имѣетъ зеленой или желтоватой цвѣтъ, и при томъ будучи весьма остра и ѣдка, и непрерывно иссекая, причиняетъ язвы; но таковая никогда у здоровой роженицы не случается, и происходитъ отъ заразной болѣзни: иногда у роженицъ послѣ родовъ бѣль случается за 3 или 4 дни передъ тѣмъ временемъ когда настоящему кровошеченію быть должно.

17. Врачеваніе бѣли поспѣшествуется тѣмъ болѣе, чѣмъ скоріе причины оной отвращаются. Напр. 1) когда бѣль причинена трудными родами; въ такомъ случаѣ спокойствіе тѣла и духа, добрая и здоровая пища, крѣпительная пища, крѣпительное питье или красныя розовыя цвѣтки вмѣсто чаю съ малымъ количествомъ купоросной кислоты употребляемые, важущія припарки и тепловатая крѣпительная примочка, и куреніе или пары благовонныхъ смолъ, подъ No. 42. означенныхъ, не посредственно къ дѣйственнымъ частямъ прикладываемыя, пользуютъ. 2) Когда бѣль случилась послѣ кровотеченія; тогда легкія питательныя, какъ шо: желе или застуженое изъ оленьяго рога, телячьихъ или бараньихъ ножекъ, прѣготовленные, питье и куреніе вышеозначенное, и пилюли бальзамическія подъ No. 43. предписанныя, полезны. 3) Когда бѣли причиною разлившееся млеко; тогда оное испражняясь выше (106. гго) показанными средствами прилеществуетъ. 4) когда бѣль происходитъ отъ мокротнаго сложенія тѣла; то сверхъ показанной пищи, жаркое особливо, крѣпительныя травы вмѣсто чаю или взвару, слабительныя лѣкарства подъ No. 45. означенныя еженедѣльно, и минеральнаго кер-

кормеса по полуграна ежедневно, употреблѣть полезно. На послѣдокъ минеральныя воды натуральныя, или искусствомъ прѣготовленныя, подъ No. 40. 44. означенныя, и частое окуриваніе, совершающѣе врачеваніе. 5) Когда бѣль случится отъ запору, и разгоряченія; въ такомъ случаѣ кровопусканіе изъ руки, легкое слабительное, подъ No. 3. предписанное, пища легкая, скоро сваривающаяся, желудка не обременяющая, съ довольномъ количествомъ поваренныхъ зелей прѣготовленная; питье подъ No. 22 или 35. предписанное: промывательныя смягчительныя: ванна, купанье въ тепловатой водѣ, и частое окуриваніе душистыми смолами дѣтеродныхъ чашпей, приносятъ значную пользу. На послѣдокъ теченіе бѣлой гнойной матеріи, происходящей отъ поврежденія или раны во время родовъ, въ мащки учиненной по излѣженію оной раны совершенно прекращается; о чемъ во своемъ мѣстѣ объявлено.

ГЛАВА СЕДМАНАДЕСЯТЬ.

О чревныхъ грыжахъ.

п8. Грыжею называется то, когда одна мягкая въ другую мягкую часть, не на-
шту-

турально пронувшись отъ своего мѣста, входитъ или низпадаетъ. Сіе случисься можетъ не только со многими чревными внутренностями, но и съ дѣшородными частями мягкими женскими. Зри о семъ главу VIII.

119. Грыжи иногда приключаются роженицамъ при родахъ, или вскорѣ по разрѣшеніи отъ бремени дѣшорожденія. Онѣ не столько бывають для нихъ опасными, сколько безпокойными.

120. Причины грыжъ могутъ быть сіи: чрезмерная напуга и усиліе, при трудныхъ родахъ спраждающе чинимыя: сильные переимы при родахъ бывающіе: ударъ въ животъ, или паденіе случайное во время беременности воспоcлѣдовавшія; корсеты, и шнуровки тѣсныя и узкія, вскорѣ послѣ родовъ носимыя.

121. Врачеваніе грыжъ совершается немедленно выпавшей части вправленіемъ въ свое мѣсто, и укрѣпленіемъ оной въ естественномъ ея положеніи. Заснарѣлыя грыжи требуютъ особливаго вниманія, и помощи искуснаго врача и лѣкаря. Подробное о семъ объясненіе моглобы превзойти предѣлы, крепкости сего сочиненія не соотвѣтствующія. Просиранію о томъ въ Хирургіи, или лѣкарской наукѣ толкуется.

ГЛАВА ВОСМАЯНАДЕСЯТЬ.

О припадкахъ матки, и и истерикѣ.

122. Истерику, или недугъ матки, или утроболѣніе, есть припадокъ вообще женскому полу, т. е. двамъ, беременнымъ и роженицамъ обыкновенно свойственный. Онъ часто различествуетъ взглядомъ степени, климакса, возраста, сложения тѣла, образа жизни и прочая. Здѣсь нужно въ краткѣ его объяснить.

123. Причины, истерику производящія, могутъ быть многоразличныя: жизнь праздная, сидячая, уединенная: печаль, тоска, сѣтованіе, неумѣренныя заботы и кручина: ревнивость, гнѣвъ, и другія возмущенія душевныя: долговременное неженіе: изобильное пресыщеніе: жестокое кровотеченіе: прекращеніе кровоочищенія: запахъ весьма душистыхъ веществъ: зрѣніе страшныхъ или непріятныхъ предметовъ: поврежденіе чувственныхъ жилъ и внутреннихъ, съ коими матка имѣетъ тѣсную связь и сообщеніе; и любострастная жизнь, суть главнѣйшими истерики причинами.

124. Знаки, истерику изъявляющіе, суть тѣ самые припадки, коими она сопровождается. Главоболѣніе, омраки, звонъ въ ушахъ,

ушахъ, дрожаніе членовъ, судорога и корча, частое воздыханіе, плачь и смѣхъ попеременно бывающія: вѣспры и опрыжки кислыя, гнилыя: слиношеченіе, зубоболѣніе, шяжелая одышка, кашель сухой и жестокій, прѣпешаніе и дрожаніе сердца частое: бѣненіе боевыхъ жилъ необыкновенное, иногда малое и медлѣнное, иногда неровное и прерывающееся, иногда частое и скорое, иногда почти едва примѣтное: лихорадка перемежающаяся, единожды или дважды въ сутки оказывающаяся: шешноша, позывъ на рвоту, и наслоющая рвота: боль, рѣзь и пуканье въ животъ: напыщеніе чрева: моча мушная: мытъ а иногда запоръ; ознобъ и жаръ: зѣвота и пошягота: опокъ ногъ попеременно являющіеся: иногда наслопаешъ глубокой сонъ, и такой, что едва дыханіе въ спраждающей ощущается. Сіи главнѣйшіе припадки, хотя не всѣ въ единое время, по меньшей мѣрѣ многіе изъ нихъ многимъ женамъ исперикою спраждающимъ, часто приключаются.

125. Опасность отъ исперики шѣмъ есть большая, чѣмъ она есть старѣе, чѣмъ чаще и долѣ случается. Ибо иногда она вскорѣ проходитъ, иногда чрезъ нѣсколько дней сразу безпрерывно продолжается. Иногда пошотъ

томъ и испариною окончивается. По прошествии истерического припадка у многихъ разумъ и воображеніе мѣшаются: нѣкоторые потеравъ память, дѣлають не благоприспѣшныя шлодвиженія, и брѣдять; нѣкоторыя ощущають жестокую боль въголовѣ, помраченіе зрѣнія, великую слабость и усталость въ цѣломъ тѣлѣ, пока прійдутъ въ совершенное разума чувствво.

126. Врачеваніе истерического недуга есть великой важности, и пребуенъ особливаго вниманія. Кровопущаніе изъ руки, ноги, или выи, почипаенъ нужнымъ и полезнымъ только тогда, когда многокровіе и прекращеніе кровоочищенія примѣчаются. Рвотныя и слабительныя легкія и мѣють здѣсь мѣсто, лишьбы съразсудкомъ употребляемы были. Разводящія усыпишельныя, и пропивусудорожныя, а особливо бобровая и кабаргинская струя и сонное зелье, въ французской водкѣ настоянныя, также Гофмановскія капли, воды цѣлительныя натуральныя, и перегнанныя изъ померанцовыхъ, цитронныхъ, липовыхъ цвѣтовъ, или подъ No. 46. 47. означенныя: горькія душистыя и крѣпительныя травы, особливо, шалфея, рута, Божье древо, бѣлая нефороцъ мелисса: лихорадачная корка, и напоследокъ шафранъ, яшмаръ и дурной духъ, различнымъ образомъ приго-

угошовленные, и умѣренно внутрь принимаемыя, приносятъ спраждающимъ истерикою великую пользу и облегченіе.

Внѣшнія лѣкарства, особливо куреніе душистыхъ смолъ, проникательныя пары, дымъ жженой бумаги, перья; кожи, рога, сѣры: ванна, баня, купль съ душистыми правами: промывательныя смягчительныя, слабительныя раздражительныя, или противусудорожныя, и бальсамическія, часто наставляемыя: усыпительныя пластыри, или подъ No. 43. przepisанной: мази, теплованія припарки и примочки, къ животу прикладываемыя: инсекція мушки, лепуція соли и спирты, особливо нащипырный, самъ собою, или съ перегнаннымъ масломъ смѣшанный, часто къ ноздрямъ прикладываемыя для обонанія: также спокойствіе тѣла, и духа, удавленіе опъ излишнихъ суетъ и заботъ, и препровожденіе времени во пріятныхъ и увеселительныхъ упражненіяхъ: благоуспѣшно опвращаютъ истерическіе припарки. Треніе тѣла, связываніе удовъ помощію повязокъ, и внезапное орошеніе лица холодною водою, часто на оное вспрыскиваемую, иногда совершенно истерику прогоняють.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВЕЩАМЪ ВЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ СОДЕРЖАЩИМСЯ.

Главы.

Страницы.

	Предбизвѣщеніе ко предбхраненію здравія и благоповеденію родильницъ относящееся	3.
	Всеобщія правила для роженицъ.	12.
I.	О кровоочистиіи родильницъ.	24.
	О прекращеніи кровоочистиія.	26.
II.	О переймахъ случающихся послѣ родовъ.	28.
III.	О млечной лихорадкѣ.	30.
IV.	О жестокомъ кровотеченіи родильницъ.	34.
V.	О воспаленіи матки.	39.
VI.	О омракахъ и судорогахъ.	42.
VII.	О разрывѣ дѣтородныхъ женскихъ частей.	44.
	О поврежденіи.	47.
	О пришибахъ.	48.
VIII.	О выпаденіи матки.	51.
	О выпаденіи рукава матки.	56.
	О выворотѣ матки.	58.
	О выпаденіи кишки.	63.
IX.	О почечуѣ.	64.
X.	О поносѣ.	65.
XI.	О непрерывномъ теченіи мочи.	67.
	О запорѣ мочи.	69.
XII.	О грудныхъ болѣзненныхъ припадкахъ.	71.
	О чрезмѣрномъ млека изобиліи.	72.
	О недостаткѣ млека.	73.
	О напряженіи и затвердѣлости сосцовъ.	74.
	О вожженіи и нарывѣ сосцовъ.	75.
XIII.	О млечной сыпи.	78.
	О лихорадкѣ съ пятнами.	80.
XIV.	О млечныхъ нарывахъ.	82.
XV.	О опухоли нижнихъ удовъ.	85.
XVI.	О бѣли.	88.
XVII.	О чревныхъ грыжахъ.	92.
XVIII.	О припадкахъ матки.	93.

ОПЕЧАТКИ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

<u>Стран.</u>	<u>Строк.</u>	<u>Напечатано.</u>	<u>Читай.</u>
8	- 17	оиѢ	онѢ
10	- 18	чтожѢ по- томѢ	чтожѢ по- томѢ?
21	- 1	разриву	разрыва
27	- 1	ощущаемая	ощущаемая ,
31	- 22	далѢ	далѢе
35	- 3	сообщее	сообщеніе
—	— 16	умаляюще- еся	умаляющійся
39	- 9	разривѢ	разрывѢ
40	- 25	доставляет- ся	доставляет- ся
45	- 24	лѣкарска	лѣкарскаго
57	- 9	безпокойны- ми	безпокойными быть мо- гутъ , но не опасными.
53	- 17	разрѣшаются	разрѣшаются
—	— 26	потребленіе	потеряніе
59	- 10	для мапки	дно мапки
64	- 5	Гл. II.	Гл. X. II.
74	- 19	наочерпанія	очерпанія
81	- 14	случающійся	случающійся
90	- 17	бораньихѢ	бараньихѢ
91	- 8	подо оN.	подѢ No.
93	- 3	и истерикѢ	или истерикѢ
94	- 29	попомѢ	попомѢ